

くすりのしおり

内服剤

2015年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:FK 配合散

主成分:メタケイ酸アルミン酸マグネシウム (Magnesium aluminometasilicate)
ジアスターゼ (Diastase)
オウレン末 (Powdered coptis rhizome)
その他を成分とする健胃整腸消化剤



剤形:類黄色の散剤

シート記載:FK 配合散、健胃整腸消化薬、FS-F01

この薬の作用と効果について

制酸剤、消炎酵素剤、胃液・消化液の分泌を促進する健胃生薬などが配合され、消化器症状を改善します。通常、食欲不振、胃部不快感、胃もたれ、吐き気・嘔吐など消化器症状の改善に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。透析療法中、ナトリウム摂取制限中、高カルシウム血症、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能亢進症、消化管潰瘍、腎不全、心機能障害、肺機能障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>
- ・通常、成人は1回1.3gを1日2～3回食後または食間に服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まずに、1回分を飛ばしてください。2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・服用中に大量の牛乳を飲むと、高カルシウム血症などの副作用が起こることがありますので、大量の牛乳を飲むことは避けてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、便秘、腎・尿路結石（腰背部痛）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・冷汗、顔面蒼白、呼吸困難 [ショック、アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。