くすりのしおり

内服剤
2013 年 07 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」

主成分：アメジニウムメチル硫酸塩(Amezinium metilsulfate)
剤形：白色の錠剤、直径 6.5mm、厚み 2.4mm
シート記載：[表面]アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」、FS-D10
[裏面]Amezinium Metilsulfate Tab.10mg"FUSO"、アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」

この薬の作用と効果について

間接的に交感神経機能を亢進させる作用があり、血管の収縮および心拍出量の増加により、血圧を上昇させます。
通常、本態性低血圧、起立性低血圧、透析施行時の血圧低下の改善に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。高血圧、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、緑内障、前立腺肥大、心臓障害がある。
・妊娠または授乳中
・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

・あなたの用法・用量は<<　　：医療担当者記入>>

・本態性低血圧、起立性低血圧：通常、成人は 1 回 1 錠（主成分として 10mg）を 1 日 2 回服用します。
透析施行時の血圧低下：通常、成人は透析開始時に 1 回 1 錠（主成分として 10mg）を服用します。
治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
・飲み忘れた場合は、忘れた分は飲まずに、1 回分を飛ばしてください。ただし、血液透析を受けている場合は、血液透析の前に気がつけば、すぐに飲んでください。2 回分を一度に飲んではいけません。
・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、動悸、ほてり感、立ちくらみ、頭痛、吐き気・嘔吐、発疹、湿疹、蕁麻疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[　]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法　その他

・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年　　月　　日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。