

くすりのしおり

注射剤

2025年09月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名：グルコリン配合静注

主成分：グリチルリチン酸一アンモニウム (Monoammonium glycyrrhizinate)
L-システイン塩酸塩水和物 (L-Cysteine hydrochloride hydrate)
グリシン (Glycine)



剤形：注射剤

シート記載など：

この薬の作用と効果について

炎症物質の生成やアレルギーをおさえる作用により肝臓の炎症をしめ肝臓の働きを改善したり、湿疹・皮膚炎などを改善します。

通常、小児ストロフルス、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚うず症、口内炎、フリクテン、薬疹・中毒疹、慢性肝疾患における肝機能異常の改善に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。アルドステロン症、ミオパチー、低カリウム血症がある。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- あなたの用法・用量は((:医療担当者記入)
- 通常、1日1回、静脈内に注射または、点滴で静脈内に注射します。
- 具体的な使用期間については、医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、低カリウム血症（脱力感、四肢の麻痺）、血圧上昇などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 血圧が下がる、気を失う、呼吸をしにくい [ショック、アナフィラキシーショック]
- 呼吸をしにくい、顔や体が赤くなる、顔やのどがはれる [アナフィラキシー]
- 全身倦怠感、手足のしびれ、血圧が上がる [偽アルドステロン症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年　　月　　日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Injection

Revised: 09/2025

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

Brand name:GULUCOLIN Injection

Active ingredient:Monoammonium glycyrrhizinate
L-Cysteine hydrochloride hydrate
Glycine



Dosage form:injection

Imprint or print on wrapping:

Effects of this medicine

This medicine relieves hepatic inflammation, improves hepatic function and eczema/dermatitis by suppressing the production of inflammatory substances and allergy.

It is usually used to improve strophulus infantum, eczema/dermatitis, hives, dermal pruritus, stomatitis, phlyctenulosis, drug eruption/toxicoderma, and abnormal hepatic function in patients with chronic liver diseases.

The following patients may need to be careful when using this medicine. Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.
If you have aldosteronism, myopathy or hypokalemia.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is((to be written by a healthcare professional))
- In general, inject into a vein or administer by intravenous infusion once a day.
Ask your doctor about the specific duration of use.

Precautions while taking this medicine

Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include hypokalemia (feeling of weakness, paralysis of the limbs) and increased blood pressure. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.

- decreased blood pressure, fainting, breathing difficulty [shock, anaphylactic shock]
- breathing difficulty, redness of the face or body, swelling of the face or throat [anaphylaxis]
- general malaise, numbness of limbs, increased blood pressure [pseudoaldosteronism]

The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.

Storage conditions and other information

For healthcare professional use only

/ /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.