

くすりのしおり

注射剂

2012 年 08 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:キシリトール注 20%「フソー」

主成分:キシリトール(Xylitol)

剂形:注射剂

シート記載:



この薬の作用と効果について

インスリンを必要とせず代謝系に入り、エネルギーを補給します。

通常、糖尿病および糖尿病状態時の水・エネルギー補給に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に菓を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低張性脱水症、尿崩症、肝障害、腎障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に菓などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>>
・通常、1日1～数回、静脈内に注射または点滴で静脈内に注射します。具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、肝障害（全身倦怠感、食欲不振、吐き気）、腎障害（全身倦怠感、尿量減少、むくみ）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。