

くすりのしおり

注射剤

2012年07月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ロカイン注 2%

主成分：プロカaine塩酸塩(Procaine hydrochloride)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

神経の活動電位の伝導を遮断して、局所麻酔作用を発揮します。

通常、硬膜外麻酔、伝達麻酔に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。メトヘモグロビン血症、重篤な出血やショック状態、注射部位またはその周辺の炎症、敗血症、高血圧、動脈硬化、心不全、甲状腺機能亢進症、糖尿病、血管痙攣がある。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- あなたの用法・用量は<<
- 通常、硬膜外麻酔、伝達麻酔として使用します。

:医療担当者記入>>

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、ねむけ、不安、興奮、霧視、眩暈、吐き気・嘔吐、じん麻疹、浮腫などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、〔 〕内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 血圧低下、顔面蒼白、脈拍の異常、呼吸抑制〔ショック〕
- 手足の震え〔振戦〕
- 筋肉が発作的に収縮する状態〔痙攣〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。