

くすりのしおり

610432025
2010年8月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：カルタン錠 500

主成分：沈降炭酸カルシウム（Precipitated calcium carbonate）

剤形：白色の錠剤 直径 10mm 厚さ 5.4mm

シート記載：CALTAN500、カルタン錠 500、500mg、M505



この薬の作用と効果について

消化管内で食物由来のリン酸イオンと結合し、難溶性のリン酸カルシウムとなって、腸管からのリンの吸収を抑え、血中リン濃度を下げます。

通常、慢性腎不全患者の高リン血症の改善に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。甲状腺機能低下症である。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** << : 医療担当者記入 >>
- ・ 通常、成人は1回2錠（主成分として1.0g）を1日3回、食直後に服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は、食後30分以上過ぎていれば、次の飲む時間に服用し、30分以内であればすぐに服用してください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ 毎日の食事は、リンの含有量の少ないものを摂取するように心がけてください。
- ・ 大量の牛乳を飲むと、高カルシウム血症（口渇、多飲・多尿）などがあらわれることがあるので、大量に牛乳を飲むことは避けてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、高カルシウム血症（口渇、多飲・多尿）、便秘、下痢、かゆみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。