

2022年7月改訂

輸液製剤配合変化情報集
アルトフェッド注射液

扶桑薬品工業株式会社

試験薬剤

製品名	分類	容量、容器	備考
アルトフェッド注射液	マルトース加酢酸維持液	200mL、PL(ポリエチレン製ボトル)	保険適用期限 2023年3月31日予定

配合方法

輸液製剤の1容器に対して、各注射剤を使用最小単位（1回分：原則1管（瓶））としてシリンジに吸い取り、混合した。乾燥製剤については、添付文書の記載に従い溶解を行った。

試験方法

輸液製剤へ混合後、直後、1、3、6、24時間後の外観およびpHを観察した（散光下、室温）。経時的に外観変化のあるものは、最初に変化が認められた時点を変化点とした。

試験実施時期

2003年2月～7月

注意事項

- 今回の配合変化試験では、目視による外観変化により評価を行っているため、環境により影響を受ける可能性を排除できない。また、残存率による評価を行っていないため、配合変化の本質は捉えていない。
- 配合変化の評価については、本資料以外に各注射剤でのpH変動試験や配合変化資料を併せて考慮する必要がある。
- 輸液製剤 - 注射剤の混合液量比率による影響も考えられるため、今回と同一薬剤の組み合わせであっても、結果が異なる場合が考えられる。
- 各製剤の添付文書に配合及び安定性に関する注意喚起の記載がある場合、「注」を付けた。配合の際は添付文書を確認することが望ましい。
- 使用した製品の社名、製品名、添付文書は2022年3月確認時点のものであり、現在のものと異なる可能性がある。
- 本剤の添付文書（2022年7月時点）には配合に関する注意喚起の記載があるため、配合の際は添付文書を確認すること。

配合薬	注	成分	含量	容器・容量	溶解液・試験液量	溶解時外観・pH	項目	開始時	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後	変化要約	薬効分類
アクラシノン注射用20mg 日本マイクロバイオ-アステラス		アクラルビシン塩酸塩	20mg(力価)	瓶・乾燥	生理食塩液 10mL	5.47	外観	黄色澄明	←	←	←	だいだい色澄明	24時間後に変色あり	423 抗腫瘍性抗生物質製剤
アザクタム注射用1g エーザイ		アズトレオナム	1g(力価)	瓶・乾燥	注射用水 5mL	4.96	外観	無色澄明	←	←	←	←	外観変化なし	612 主としてグラム陰性菌に作用するもの
アスピラカリウム注射用10mEq ニブロESファーマ		L-アスピラギン酸カリウム	1712mg	管・10mL	10mL	無色澄明	6.93	外観	無色澄明	←	←	←	外観変化なし	322 無機質製剤
アタラックス-P注射液(50mg/mL) ファイザー		ヒドロキシジン塩酸塩	50mg	管・1mL	1mL	無色澄明		4.10	外観	無色澄明	←	←	外観変化なし	117 精神神経用剤
アデール点滴静注用10mg(販売中止) 日本化薬	注	コルホルシンダロバート塩酸塩	10mg	瓶・乾燥	生理食塩液 5mL	無色澄明	4.47	外観	無色澄明	←	←	←	外観変化なし	211 強心剤
アデラビン9号注2mL マイラン-ファイザー		肝臓エキス・フラビンアデニジスクレオチド	30μL-20mg (ラビンアデニジスクレオチドナトリウム 21.12mg)	管・2mL	2mL	橙黄色澄明	6.00	外観	黄色澄明	←	←	←	外観変化なし	326 臓器製剤
アトニン-0注5単位 あすか-武田		オキシトシン	5オキシトシン単位	管・1mL	1mL	無色澄明		3.68	外観	無色澄明	←	←	外観変化なし	241 脳下垂体ホルモン剤
アドリアシン注用10 サンドファーマ-サンド		ドキソリビシン塩酸塩	10mg(力価)	瓶・乾燥	注射用水 1mL	赤色澄明	5.31	外観	だいだい色澄明	←	←	←	外観変化なし	423 抗腫瘍性抗生物質製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フゾー」 扶桑		アトロピン硫酸塩水和物	0.5mg	管・1mL	1mL	無色澄明		5.64	外観	無色澄明	←	←	外観変化なし	124 鎮痙剤
アナフラニール点滴静注液25mg アルフレッサファーマ		クロミプラミン塩酸塩	25mg	管・2mL	2mL	無色澄明	4.33	外観	無色澄明	←	←	←	外観変化なし	117 精神神経用剤
アネキセート注射液0.5mg サンドファーマ-サンド		フルマゼニル	0.5mg	管・5mL	5mL	無色澄明		4.13	外観	無色澄明	←	←	外観変化なし	221 呼吸促進剤
アプレゾリン注射用20mg サンファーマ		ヒドララジン塩酸塩	20mg	管・乾燥	注射用水 1mL	淡黄色澄明	3.89	外観	無色澄明	微黄色澄明	←	←	1時間後に変色あり	214 血圧降下剤
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 日医工		アミカシン硫酸塩	200mg(力価)	管・2mL	2mL	無色澄明		6.56	外観	無色澄明	←	←	外観変化なし	612 主としてグラム陰性菌に作用するもの
アラセナーA点滴静注用300mg 持田	注	ビダラビン	300mg	瓶・乾燥	混注輸液 10mL	無色澄明 (2バイアルを500mL生理食塩液に混ぜてpH測定)	3.39	外観	白濁	←	←	無色澄明	直後白濁	625 抗ウイルス剤
アリナミンF100注 武田テバ-武田		フルスルチアミン塩酸塩 100mg (フルスルチアミン塩酸塩 109.16mg)	管・20mL	20mL	無色澄明	3.07	外観	無色澄明	←	←	←	外観変化なし	312 ビタミンB1剤	
アルタット静注用75mg あすか-武田		ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	75mg	管・乾燥	生理食塩液 20mL	無色澄明	4.10	外観	無色澄明	←	←	←	外観変化なし	232 消化性潰瘍用剤
アレビアチン注250mg 大日本住友製薬	注	フェニトイントナトリウム	250mg	管・5mL	5mL	無色澄明	11.76	外観	白濁	←	←	←	直後白濁	113 抗てんかん剤
安息香酸Naカフェイン注200mg「フゾー」 扶桑		安息香酸ナトリウムカフェイン	200mg	管・1mL	1mL	無色澄明	7.86	外観	無色澄明	←	←	←	外観変化なし	211 強心剤
イスコチン注100mg アルフレッサファーマ		イソニアジド	100mg	管・2mL	2mL	無色澄明		7.05	外観	無色澄明	←	←	外観変化なし	622 抗結核剤
イソゾール注射用0.5g 日医工	注	チアミラールナトリウム	500mg	管・乾燥	注射用水 20mL	微黄色澄明	10.71	外観	白濁	←	←	←	直後白濁	111 全身麻酔剤
イノパン注200mg(販売中止) 協和キリン		ドパミン塩酸塩	200mg	管・10mL	10mL	無色澄明	4.00	外観	無色澄明	←	←	←	外観変化なし	211 強心剤
注射用イホマイド1g 塙野義		イホスファミド	1g	瓶・乾燥	注射用水 25mL	無色澄明		6.64	外観	無色澄明	←	←	外観変化なし	421 アルキル化剤
インデラル注射液2mg 太陽ファルマ		プロプラノロール塩酸塩	2mg	管・2mL	2mL	無色澄明	3.04	外観	無色澄明	←	←	←	外観変化なし	212 不整脈用剤

アルトフェッド注射液

注)添付文書に配合、安定性等に関する注意の記載あり。

扶桑薬品工業株式会社

配合薬	注	成分	含量	容器・容量	溶解液・試験液量	溶解時外観・pH	項目	開始時	1時間後	3時間後	6時間後	24時間後	変化要約	薬効分類
メイセリン静注用1g Meiji Seika ファルマ	注	セフミノクスナトリウム水和物	1g(力価)	瓶・乾燥	注射用水 20mL	無色透明 5.42	外観 pH	無色透明 5.37	← 5.38	← 5.37	← 5.37	微黄色透明 5.29	24時間後に変色あり	613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メキシチール点滴静注125mg 太陽ファルマ		メキシレチン塩酸塩	125mg	管・5mL	5mL	無色透明 5.56	外観 pH	無色透明 5.35	← 5.35	← 5.35	← 5.34	微黄色透明 5.37		212 不整脈用剤
メチコバール注射液500μg エーザイ	メコバラン	500μg	管・1mL	1mL	赤色透明	8.01	外観 pH	淡赤色透明 5.37	← 5.38	← 5.37	← 5.37	微黄色透明 5.38	外観変化なし	313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
メドレニック注シリジ 武田テバ-武田	配合剤	—	シリング・2mL	2mL	暗赤褐色のコロイド液		外観 pH	黄色透明 5.36	← 5.36	← 5.36	← 5.37	微黄色透明 5.36		322 無機質製剤
メルカゾール注10mg あすか-武田	チアマゾール	10mg	管・1mL	1mL	無色透明	5.98	外観 pH	無色透明 5.36	← 5.36	← 5.36	← 5.37	微黄色透明 5.35	外観変化なし	243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
メロペン点滴用バイアル0.5g 大日本住友	メロペネム水和物	0.5g(力価)	瓶・乾燥	生理食塩液 10mL	極微黄色透明		外観 pH	無色透明 6.45	← 6.47	← 6.50	← 6.52	微黄色透明 6.51		613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
モダシン静注用1g GSK	セフタジム水和物	1g(力価)	瓶・乾燥	生理食塩液 5mL	淡黄色透明	6.53	外観 pH	無色透明 5.56	← 5.59	← 5.58	← 5.58	微黄色透明 5.57	24時間後に変色あり	613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ラボナール注射用0.5g ニプロESファーマ	チオペンタールナトリウム	0.5g	管・乾燥	添付溶解液 20mL	微黄色透明		外観 pH	白濁 6.04	← 6.85	← 6.32	← 6.18	微黄色透明 6.99		111 全身麻酔剤
リスマドンP静注50mg クリニジェン	ジソピラミドリン酸塩	64.4mg(ジソピラミドとして50mg)	管・5mL	5mL	無色透明	4.68	外観 pH	無色透明 5.37	← 5.37	← 5.36	← 5.37	微黄色透明 5.35	外観変化なし	212 不整脈用剤
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 Meiji Seika ファルマ	カナマイシン硫酸塩	1g(力価)	管・4mL	4mL	極微黄色透明		外観 pH	無色透明 5.83	← 5.82	← 5.81	← 5.81	微黄色透明 5.79		616 主として抗酸菌に作用するもの
硫酸Mg補正液1mEq/mL 大塚工場-大塚	硫酸マグネシウム水和物	2.46g	管・20mL	20mL	無色透明	5.92	外観 pH	無色透明 5.25	← 5.21	← 5.22	← 5.22	微黄色透明 5.20	外観変化なし	124 鎮けい剤
リンコシン注射液1.5g ファイザー	リンコマイシン塩酸塩水和物	1.5g(力価)	瓶・5mL	5mL	無色透明		外観 pH	無色透明 5.34	← 5.34	← 5.33	← 5.35	微黄色透明 5.34		611 主としてグラム陽性菌に作用するものの
リンデロン注100mg(2%) シオノギファーマ-塩野義	ベタメゾンリン酸エステルナトリウム	131.6mg(ベタメゾンとして100mg)	管・5mL	5mL	無色透明	7.89	外観 pH	無色透明 5.53	← 5.53	← 5.53	← 5.54	微黄色透明 5.53	外観変化なし	245 副腎ホルモン剤
レブチラーゼ注2単位 東菱	ヘモコアグラーーゼ液	0.08mL(2クロブスイツキー単位)	管・2mL	2mL	無色透明		外観 pH	無色透明 5.36	← 5.36	← 5.36	← 5.37	微黄色透明 5.36		332 止血剤
ロイコン注射液20mg 大原	アデニン	20mg	管・2mL	2mL	無色透明	6.24	外観 pH	無色透明 5.41	← 5.41	← 5.42	← 5.42	微黄色透明 5.41	外観変化なし	419 その他の細胞賦活用薬
ロイナーゼ注用10000 協和キリン	L-アスパラギナーゼ凍結乾燥品	10000K.U.	瓶・乾燥	注射用水 5mL	無色透明		外観 pH	無色透明 5.36	← 5.39	← 5.39	← 5.38	微黄色透明 5.36		429 その他の睡瘧用薬
ロセフィン静注用1g 太陽ファルマ	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g(力価)	瓶・乾燥	注射用水 10mL	黄色透明	6.74	外観 pH	無色透明 5.44	← 5.44	← 5.44	← 5.44	微黄色透明 5.46	1時間後に変色あり	613 主としてグラム陽性菌・陰性菌に作用するもの
ワソラン静注5mg エーザイ	ベラパミル塩酸塩	5mg	管・2mL	2mL	無色透明		外観 pH	無色透明 5.35	← 5.35	← 5.36	← 5.35	微黄色透明 5.37		212 不整脈用剤