

# 新発売ご案内

H<sub>2</sub>受容体拮抗剤

**ガスマット<sup>®</sup>D錠10mg**  
**ガスマット<sup>®</sup>D錠20mg**

指定医薬品

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこのほど薬価基準に新たに収載されました東菱薬品工業(株)製造販売のH<sub>2</sub>受容体拮抗剤 **ガスマットD錠10mg**及び**ガスマットD錠20mg**を新発売させていただくことになりました。

どうか在来の製品ともどもよろしくお引立て賜りますよう、お願い少々ご案内申し上げます。

敬白

平成20年7月



## 組成・性状

販売名	ガスマットD錠10mg	ガスマットD錠20mg					
成分・含量 (1錠中)	ファモチジン 10mg	ファモチジン 20mg					
添加物	セルロース、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルスターチ、カンテン、ブドウ糖、炭酸水素ナトリウム、サッカリンナトリウム水和物、香料、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム						
色調・剤形	白色の口腔内崩壊錠であり、特異な芳香があり、味は甘い。						
外形・サイズ (mm)							
	A	7.0	B	3.2	A	8.0	B
重さ (mg)	約120		約150				
識別コード	TBP262		TBP263				

(裏面もごらん下さい。)



**扶桑薬品工業株式会社**

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

**作用・特徴** 本剤はH<sub>2</sub>受容体拮抗剤であるファモチジンを水なし（唾液のみ）でも服用出来るように口腔内崩壊錠として製剤化したしました。

**効能・効果** 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血（消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による）、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群  
 下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善  
 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期

**用法・用量** 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血（消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による）、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群  
 通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを1日2回（朝食後、夕食後または就寝前）経口投与する。また、1回40mgを1日1回（就寝前）経口投与することもできる。  
 なお、年齢・症状により適宜増減する。ただし、上部消化管出血の場合には通常注射剤で治療を開始し、内服可能になった後は経口投与に切りかえる。  
 下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善  
 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期  
 通常、成人にはファモチジンとして1回10mgを1日2回（朝食後、夕食後または就寝前）経口投与する。また、1回20mgを1日1回（就寝前）経口投与することもできる。  
 なお、年齢・症状により適宜増減する。

**使用上の注意** 製品添付文書をごらん下さい。

**規制区分** 指定医薬品

**貯法** 室温保存

**使用期限** 3年

メーカーコード〔197〕

品名	規格・包装	統一商品コード	薬価基準	包装薬価		梱包単位	備考
ガスメットD錠10mg	(PTP) 10錠×10	206162	18.20	1,820	円	100	
	10錠×50	206179		9,100	円	20	
ガスメットD錠20mg	(PTP) 10錠×10	206186	45.20	4,520		100	
	10錠×50	206193		22,600		20	

品名	規格・包装	個装		外装	
		重量(g)	縦×横×高さ(mm)	重量(kg)	縦×横×高さ(mm)
ガスメットD錠10mg	(PTP) 10錠×10	47	45×140×35	5.2	294×367×250
	(PTP) 10錠×50	184	43×140×115	4.2	294×460×135
ガスメットD錠20mg	(PTP) 10錠×10	50	45×140×35	5.5	294×367×250
	(PTP) 10錠×50	200	46×145×115	4.6	306×490×135

JANシンボル

ガスメットD錠10mg		ガスメットD錠20mg	
(PTP) 10錠×10	(PTP) 10錠×50	(PTP) 10錠×10	(PTP) 10錠×50
 4 987197 206162	 4 987197 206179	 4 987197 206186	 4 987197 206193