

炭酸ランタンOD錠^{250mg}/_{500mg}「フソー」 を服用される患者さんへ

250mg



500mg



このお薬は、**高リン血症**を治療するためのお薬です。
食事に含まれるリンと消化管内で結合して、
リンの吸収を抑えるはたらきがあります。

このお薬（OD錠：口腔内崩壊錠）は、水なしでも飲むことができます。水なしで服用する場合は、舌の上ののせ唾液で湿らせて、舌で軽くつぶしてから唾液と一緒に飲み込んで下さい。水またはぬるま湯で飲むこともできます。寝たままでは、水なしで飲まないで下さい。

（裏面につづく）

服用時の注意点

- このお薬は食直後(食べたらすぐ)に服用して下さい。
- このお薬による吐き気は、食事の直後に服用すると減少することが知られています。
- 食事をとらなかった場合は、お薬の効果が期待できませんので、服用はお控え下さい。食後30分以上過ぎて、飲み忘れに気がついた場合は、次の食事の直後まで服用しないで下さい。2回分を一度に服用しないで下さい。
- このお薬が胃腸管にあると、腹部レントゲン等の撮影時にお薬の影が映ることがあります。検査時には医師にご相談下さい。

次のような場合には、早めに主治医または薬剤師にご相談下さい

- ・嘔吐、吐き気などの症状があらわれた時
- ・その他、何か気になることや、わからないことがあった時