

タダラフィル錠 2.5mg・5mg ZA「フソー」 を服用される患者さんへ



このお薬は、**前立腺肥大症に伴う排尿障害を治療するお薬**です。

服用前に必ず次の点をご確認下さい

●狭心症などの心臓病に用いられる**ニトログリセリン**などの硝酸薬や慢性血栓栓性肺高血圧症の治療薬の**リオシグアト**を服用されている方は、**このお薬を服用することができません。**

一緒に服用すると過度な血圧低下を起こすことがあります。

- その他、以下の方もこのお薬を服用しないで下さい。
- ・以前、このお薬の成分に過敏な反応を起こしたことがある方
 - ・不安定狭心症の方
 - ・日常的な身体活動以下の労作で症状が生じたり高度な身体活動の制限がある心不全の方
 - ・安定していない不整脈 ・ 低血圧 ・ 高血圧の方
 - ・最近3ヵ月以内に心筋梗塞を起こしたことがある方
 - ・最近6ヵ月以内に脳梗塞 ・ 脳出血を起こしたことがある方
 - ・重い腎障害 ・ 肝障害がある方

(裏面につづく)



扶桑薬品工業株式会社

2020年6月作成
DK・211・211A

服用中の注意点

- 医師の指示通りに服用して下さい。決して自分で服用量を増やしてはいけません。必ず1日1回の服用として下さい。
- めまいや視覚障害(目のかすみなど)があらわれることがあります。高所作業や自動車の運転等危険を伴う機械を操作する場合には注意して下さい。
- 他の医師を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師に伝えて下さい。
- このお薬は医師の処方が必要なお薬です。
このお薬を決して他の人に譲り渡したりしないで下さい。

次のような場合には、早めに主治医または薬剤師にご相談下さい

- ・ 4時間以上勃起が続く
- ・ 目が見えにくい
(急に視力が低下する、目が見えなくなるなど)
- ・ 耳が聞こえにくい
(急に聞こえがわるくなる、突然聞こえなくなるなど)
- ・ その他、何か気になることや、わからないことがあった時