ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「フソー」を服用される患者さんへ

このお薬は、**透析または肝疾患治療を受けておられる方のかゆみを抑える**お薬です。

服用時の注意点

●このお薬は、水なしでも飲むことができます。
水なしで服用する場合は、舌の上にのせ唾液で湿らせて、舌で軽くつぶしてから唾液と一緒に飲み込んで下さい。
水またはぬるま湯で飲むこともできます。

●このお薬は、1日1回、夕食後又は就寝前に服用するお薬です。
夕食後の服用指示を受けている方は、飲み忘れに気がついたのが、その日の就寝前であれば、1回分を服用して下さい。
それ以外の服用指示の場合は、1回とばして、次の服用時間に1回分服用して下さい。2回分を一度に服用しないで下さい。

保管時の注意点

●気温や湿度の高い場所や光のあたる場所を避けて保管して下さい。

（裏面につづく）

扶桑薬品工業株式会社
2021年5月作成
DK-310・310A

服用中の注意点

●服用し始めてから、以下のような症状があらわれることがあります。このような症状に気が付いたら、医師または薬剤師にご相談下さい。

○不眠（なかなか寝付けない）

○便秘

○頻尿・夜間頻尿
（肝疾患治療を受けておられる方に注意してほしい症状です）

○眠気、めまい（フワフワ浮いているようなめまい）



●眠気やめまいなどがあらわれることがありますので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作には従事しないで下さい。

これ以外にも、気になること、わからないことがありましたら、医師または薬剤師にご相談下さい。