

球形吸着炭細粒「マイラン」を服用される患者さんへ



球形吸着炭細粒「マイラン」は、
腎臓が悪くなるのを遅らせるお薬です。

服用時の注意点

このお薬と他のお薬を服用する場合は、同時に服用しないで、
他のお薬を服用後30分～1時間くらい時間をずらしてから、
このお薬を服用して下さい。

※同時に服用すると、他のお薬の作用を弱めたりするおそれがあります。

飲み忘れに気がついた場合、すぐに1回分を服用して下さい。

ただし、次の服用時間が近い場合は、1回とばして、次の服用時間に1回分
服用して下さい。

2回分を一度に服用しないで下さい。

次のような場合には、早めに主治医または薬剤師にご相談下さい

- ・ お薬が飲みにくい時
- ・ 便秘、吐き気・嘔吐、腹痛、下痢や皮疹、かゆみなどの症状が現れた時
- ・ その他、何か気になることや、わからないことがあった時



服用方法

初めに口に少量の水をふくみ、お薬を口の中へ入れ、その後一気に飲み込むようにして下さい。


- ・お薬が気管に入らないように注意して下さい。
- ・入れ歯、歯を治療中の方は、歯の隙間に入らないように注意して下さい。

服用の工夫

薬局・薬店で販売されている「袋オブラート」に移してこのお薬を飲むと上手に服用することが出来ます。

「袋オブラート」を使った球形吸着炭細粒の飲み方

① 球形吸着炭細粒



お薬を開封し
袋オブラートに移します。

②



オブラートの上部を
ねじって細長くして
飲みやすくします。

③



ねじった袋オブラートを
コップの水にぬれる程度
浸し、そのあと少量の
水とともに服用します。

取扱い


このお薬を机や床にこぼした時は、早めにタオルなどで拭き取るか、掃除機で吸い取るようにして下さい。

なお、皮膚等に触れても、害はありません。

球形吸着炭細粒「マイラン」を服用される患者さんへ

お薬のスティックが膨らんでいる場合がありますが、お薬に影響はありません。

このお薬は、無数の目に見えない細かな孔(あな)があいている黒色の吸着炭です。



温度変化により、この孔に空気が出たり入ったりします。スティックの中には、空気が入ってますのでスティックが膨らんだり元に戻ったりします。このスティックの膨らみは吸着炭の性質によるものなので、お薬に影響はありません。

