くすりのしおり

内服剤
2014 年 08 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：イコサペント酸エチルカプセル 300mg「フソー」

主成分：イコサペント酸エチル(Ethyl icosapentate)
剤形：淡黄色透明のカプセル剤、長径 18mm、短径 7mm
シート記載：（表）イコサペント酸エチルカプセル 300mg「フソー」、EPA 製剤、FS-E15
（裏）イコサペント酸エチルカプセル 300mg「フソー」、Ethyl Icosapentate Cap.300mg"FUSO"、EPA 製剤

この薬の作用と効果について

血液凝集バランスを血小板凝集抑制の方向に働かせ、血栓形成を防ぎ、血流を改善します。また、血液中のコレステロールや中性脂肪を下げ高脂血症を改善します。
通常、閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、痛み・冷感の改善や、高脂血症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。出血している（血友病、毛細血管脆弱症、消化管潰瘍、尿路出血、喀血、硝子体出血）、出血傾向、手術の予定がある。
・妊娠または授乳中
・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

・あなたの用法・用量は<<　　：医療担当者記入>>
・閉塞性動脈硬化症：通常、成人は 1 回 2 カプセル（主成分として 600mg）を 1 日 3 回食直後に服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
高脂血症：通常、成人は 1 回 3 カプセル（主成分として 900mg）を 1 日 2 回または 1 回 2 カプセル（600mg）を 1 日 3 回食直後に服用しますが、トリグリセリド異常がある場合は 1 回 3 カプセル（900mg）を 1 日 3 回まで増量されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
・空腹時に服用すると、薬の吸収が悪くなるので、食後すぐに、かまずに服用してください。
・飲み忘れた場合は忘れた分は飲まずに、1 回分を飛ばしてください。2 回分を一度に飲んではいけません。
・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、かゆみ、貧血、吐き気、腹部不快感、下痢、便秘、食欲不振、全身倦怠感、皮下出血（青あざ）、血尿、歯肉出血、眼底出血、鼻出血、消化管出血、黄疸、咳、呼吸困難などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[　]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。
・全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる［肝機能障害、黄疸］

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法　その他

・乳幼児、小児の手の届かないところで、光、高温、湿気を避けて保管してください。
・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年　　月　　日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。