

くすりのしおり

内服剤

2016 年 06 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ヘモリンガル舌下錠 0.18mg

主成分：静脈血管叢エキス (Venous plexus extract)

剤形：白色の錠剤、直径 6.0mm、厚み 3.0mm

シート記載：FS-H08、ヘモリンガル舌下錠 0.18mg



この薬の作用と効果について

微小循環の調節機能を改善し、血液の流れを良くして炎症や腫れを抑えます。

通常、痔核の症状（出血、痛み、腫れ、かゆみ）を改善します。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>>
- ・通常、1 回 1 錠（主成分として 0.18mg）を 1 日 3 回舌下で服用しますが、治療を受ける年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・この薬は舌下錠のため、舌下で溶かして口腔粘膜から徐々に吸収させます。飲みこんでしまうと効果が減ってしまうので、必ず舌下で服用してください。
- ・飲み忘れた場合は気づいた時にできるだけ早く 1 回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は、1 回とばしてください。2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、悪心、食欲不振、下痢、かゆみ、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。