

くすりのしおり

注射剤

2016 年 10 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名: サブラッド血液ろ過用補充液 BSG

主成分: ろ過型人工腎臓用補充液

剤形: 無色透明の注射剤

シート記載:



この薬の作用と効果について

血液透析時の電解質・酸塩基平衡異常、水分過剰状態を是正し、血糖を維持します。

通常、血液ろ過または血液透析ろ過で、ろ過された体液の補充に使用されます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を飲んで、または注射を受けて、発しんやかゆみなどが出たことがある。酢酸代謝障害。心臓が悪い。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<< : 医療担当者記入>>
- ・通常、透析回路中に使用します。
- ・通常の血液ろ過では 4～7 時間使用します。また血液透析ろ過の場合では 3～5 時間使用します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

血液ろ過、血液透析ろ過の副作用として、低血圧、ショック、不均衡症候群（頭痛、吐き気・嘔吐、痙攣、胸内苦悶、全身倦怠感）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。