

くすりのしおり

内服剤

2018 年 12 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ジメチコン錠 40mg「フソー」

主成分：ジメチコン (Dimethicone)

剤形：白色の錠剤、直径 10mm、厚み 5.0mm

シート記載：[表面]ジメチコン錠 40mg「フソー」、ジメチコン 40、40、FS-G05
[裏面]Dimethicone Tab. 40mg ” FUSO”、ジメチコン 40「フソー」、胃腸内ガス駆除薬



この薬の作用と効果について

胃腸管内のガス気泡の表面張力を低下させて体外へオクビや放屁として排泄させやすくします。通常、胃腸管内のガスを原因とする腹部症状の改善や、胃内視鏡検査や腹部 X 線検査の前の胃腸管内ガスの駆除に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（（ ）：医療担当者記入）
- ・胃腸管内のガスを原因とする腹部症状：通常、成人は 1 回 1～2 錠（主成分として 40～80mg）を 1 日 3 回食後または食間に服用します。
胃部内視鏡検査時の胃内有泡性粘液の除去：検査 15～40 分前に、通常、成人は 1～2 錠（主成分として 40～80mg）を約 10mL の水とともに服用します。
腹部 X 線検査時の胃腸管内のガスの除去：検査 3～4 日前から、通常、成人は 1 回 1～2 錠（主成分として 40～80mg）を 1 日 3 回食後または食間に服用します。
いずれの場合も、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まずに、1 回分を飛ばしてください。2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、軟便、胃部不快感、下痢、腹痛、嘔吐、吐き気、食欲不振などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。