

くすりのしおり

注射剤

2020年12月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：炭酸水素 Na 静注 1.26%バッグ「フソー」

主成分：炭酸水素ナトリウム(Sodium bicarbonate)

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

血液の pH を上昇させる働きがあります。

通常、薬物中毒の際の排泄促進、アシドーシス（血液が酸性である状態）、急性じんましの治療に用いられます。また、乗り物酔い、メニエール症候群、その他の内耳障害に伴う吐き気・嘔吐およびめまいの治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。心臓または腎臓に病気がある。末梢および肺浮腫がある。高血圧症、低カルシウム血症、低カリウム血症、妊娠中毒症がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、静脈内に注射します。具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、血液凝固時間延長、口唇しびれ感、知覚異常、血管痛、発熱、全身冷感、不快感、貧血、吐き気、徐脈などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。