

# くすりのしおり

注射剤

2022年06月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**製品名：レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「フソー」**

**主成分：**レボカルニチン (Levocarnitine)

**剤形：**注射剤

**シート記載など：**



## この薬の作用と効果について

カルニチン欠乏状態を改善することによりミトコンドリア機能を活発にし、けいれん発作、筋緊張の低下などの症状を改善します。

通常、カルニチン欠乏症の改善に使用されます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腎障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、3～6時間ごとに緩徐に静脈内に注射するか、点滴で静脈内に注射します。血液透析に伴うカルニチン欠乏症に対しては、通常、透析終了時に、透析回路の静脈側から注入します。
- ・注射の間隔は、一緒に使用する他の薬や、患者さんの状態などによって異なりますので、具体的なスケジュールについては、医師に確認してください。
- ・症状、効果を見ながら長期間使うことがあります。

## 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

副作用として、食欲不振、下痢、軟便、腹部膨満感、顔面浮腫、血尿、貧血などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

# Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Injection

Published: 06/2022

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

**Brand name:** Levocarnitine FF Syringes 1000mg "FUSO"

**Active ingredient:** Levocarnitine

**Dosage form:** Injection

**Imprint or print on wrapping:**



## Effects of this medicine

This medicine activates mitochondrial function by improving a carnitine deficient state, and improves the symptoms such as convulsive attack and hypotonia.

It is usually used for the treatment of carnitine deficiency.

## The following patients may need to be careful when using this medicine. Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.
- If you have renal disorder.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

## Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is(( to be written by a healthcare professional))
- In general, this medicine is administered by slow intravenous injection or by intravenous drip infusion, at intervals of 3 to 6 hours. For carnitine deficiency that may occur during hemodialysis, the medicine is generally administered by injection into the venous side of the hemodialysis circuit at the end of dialysis.
- The injection interval will depend on the type of concomitant medicines that you are taking and your condition. Consult with your doctor regarding the specific dosing schedule.
- You may need to use this medicine for a long period of time depending on your symptoms and response.

## Precautions while taking this medicine

### Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include loss of appetite, diarrhea, loose stools, enlarged feeling of abdomen, facial edema, hematuria, and anemia. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

**The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.**

No pertinent entries.

**The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.**

## Storage conditions and other information

**For healthcare professional use only** / /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.