

## くすりのしおり

注射剤

2022 年 05 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**製品名:**ブドウ糖注 5%PL「フソー」100mL

**主成分:**精製ブドウ糖(Purified glucose)

**剤形:**注射剤

**シート記載など:**



### この薬の作用と効果について

静脈内投与されたブドウ糖は、体内でエネルギー源となり代謝されます。

通常、注射剤の溶解希釈に用いられます。

### 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。低張性脱水症、カリウム欠乏傾向、糖尿病、尿崩症、腎不全がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は(( :医療担当者記入))
- ・通常、静脈内に注射または点滴します。
- ・具体的な使用期間については、医師にお聞きください。

### 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、急速・大量投与時の電解質喪失により食欲不振、吐き気、嘔吐、口渇、頭痛、脱力感、倦怠感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法 その他

### 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

# Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Injection

Published: 05/2022

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

**Brand name:**5% Glucose Injection PL“FUSO”100mL

**Active ingredient:**Purified glucose

**Dosage form:**Injection

**Imprint or print on wrapping:**



## Effects of this medicine

When glucose is administered intravenously, it is used as a source of energy and metabolized in the body.

This medicine is usually used to dissolve or dilute other medicines for injection.

## The following patients may need to be careful when using this medicine.Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.  
If you have or have hypotonic dehydration, tendency of potassium deficiency, diabetic mellitus, diabetes insipidus or renal failure.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

## Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is(( to be written by a healthcare professional))
- In general, administer by intravenous injection or intravenous infusion.  
Ask your doctor about the duration of use.

## Precautions while taking this medicine

## Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include loss of appetite, nausea, vomiting, dry mouth, headache, lassitude and malaise due to loss of electrolytes following rapid or large dose administration. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

**The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.**

No pertinent entries.

**The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.**

## Storage conditions and other information

**For healthcare professional use only** / /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.