

# くすりのしおり

内服剤

2019 年 12 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力がが必要です。

## 商品名：ポリスチレンスルホン酸 Na「フソー」原末

主成分：ポリスチレンスルホン酸ナトリウム (Sodium polystyrene sulfonate)

剤形：黄褐色の粉末

シート記載：高カリウム血症改善薬、ポリスチレンスルホン酸 Na「フソー」原末、5g、Sodium Polystyrene Sulfonate "FUSO"、FS-K14



## この薬の作用と効果について

ナトリウム型陽イオン交換樹脂で、イオン交換によりナトリウムとカリウムのイオンを交換し、高くなったカリウムイオンを体外に排出させます。

通常、急性および慢性腎不全に伴う高カリウム血症の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は 1 日 30g を 2～3 回に分け、その 1 回量を水 50～150mL にかき混ぜて服用しますが、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで 1 回分を飛ばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、便秘、下痢、胃部不快感、吐き気、嘔吐、食欲不振、腹痛、めまい、倦怠感、低カリウム血症（脱力感、手足の震え）、むくみ、血圧上昇（動悸、頭痛）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・動悸、息切れ、浮腫 [心不全誘発]
- ・激しい腹痛、下痢、嘔吐 [腸穿孔、腸潰瘍、腸壊死]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

# Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Internal

Published: 12/2019

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

**Brand name:**Sodium Polystyrene Sulfonate "FUSO" Powder

**Active ingredient:**Sodium polystyrene sulfonate

**Dosage form:**yellowish brown powder

**Imprint or print on wrapping:**高カリウム血症改善薬,ポリスチレンスルホン酸 Na「フソ」原末,5g,Sodium Polystyrene Sulfonate "FUSO",FS-K14



## Effects of this medicine

This medicine is sodium type of cation-exchange resin which exchanges potassium ions for sodium ions, and excretes excess potassium ions.

It is usually used to treat hyperkalemia due to acute or chronic renal failure.

## The following patients may need to be careful when using this medicine.Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

## Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is(( to be written by a healthcare professional))
- In general, for adults, take 30 g a day in 2 to 3 divided doses, by suspending the one divided amount in 50 to 150 mL of water. The dosage may be adjusted according to your symptoms. Strictly follow the instructions.
- If you miss a dose, take the missed dose as soon as possible. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and follow your regular dosing schedule. You should never take two doses at one time.
- If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist.
- Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

## Precautions while taking this medicine

## Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include constipation, diarrhea, stomach discomfort, nausea, vomiting, loss of appetite, abdominal pain, vertigo, malaise, hypokalemia (lassitude, trembling limbs), edema, and increased blood pressure (palpitation, headache). If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

**The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.**

- palpitation, shortness of breath, edema [induction of cardiac failure]
- severe abdominal pain, diarrhea, vomiting [intestinal perforation, intestinal ulcer, intestinal necrosis]

**The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.**

## Storage conditions and other information

- Keep out of the reach of children. Store away from direct sunlight, heat and moisture.
- Discard the remainder. Do not store them.

## For healthcare professional use only / /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.