

——— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 ———

使用上の注意改訂のお知らせ

高リン血症治療剤

日本薬局方

沈降炭酸カルシウム錠

カルタン[®]錠500

日本薬局方

沈降炭酸カルシウム細粒

カルタン[®]細粒83%

カルタン[®]OD錠500mg

このたび標記製品につきまして、**使用上の注意**を下記のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

令和2年5月

製造販売元  **マイラン製薬株式会社**
Mylan 大阪市中央区本町2丁目6番8号

販売元  **扶桑薬品工業株式会社**
大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

1. 改訂内容（自主改訂：下線部追記・変更）

改訂後			改訂前		
10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）			10. 相互作用 10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(省略、変更なし)	(省略、変更なし)	(省略、変更なし)	(省略)	(省略)	(省略)
活性型ビタミンD剤 (省略、変更なし)	(省略、変更なし)	(省略、変更なし)	活性型ビタミンD剤 (省略)	(省略)	(省略)
ロキサデュスタット	ロキサデュスタットと併用した場合、ロキサデュスタットの作用が減弱するおそれがあるため、併用する場合は、前後1時間以上あけて本剤を服用すること。	ロキサデュスタットを酢酸カルシウムと同時投与したところ、ロキサデュスタットのAUC _{inf} が低下した。	(←追記)		

2. 改訂理由（自主改訂）

● 「相互作用（併用注意）」の項

腎性貧血治療薬であるロキサデュスタット(エベレンゾ錠)の添付文書において、「相互作用（併用注意）」の項に本成分であるカルシウムが記載されたことから、本剤の添付文書においてもロキサデュスタットを追記し、注意喚起を行うことと致しました。

3. 本情報は医薬品安全対策情報(D S U)No. 289(令和2年6月発行予定)に掲載されます。

☆添付文書情報は、「医薬品医療機器総合機構ホームページ(URL: <https://www.pmda.go.jp/>)」及び「弊社ホームページ(URL: <https://www.fuso-pharm.co.jp/>)」においてご確認ください。

【本件に関するお問い合わせ先】
扶桑薬品工業株式会社 安全管理統括部
TEL 06-6969-1131 FAX 06-6969-3139