

————— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —————

## 使用上の注意改訂のお知らせ

血液凝固阻止剤  
生物由来製品  
指定医薬品  
処方せん医薬品<sup>注)</sup>  
**リザルミン® 注1000**

このたび血液凝固阻止剤リザルミン注1000につきまして、平成18年3月24日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知及び自主改訂に基づき、**使用上の注意**を下記のとおり改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。

平成18年4月

製造販売元  **伊藤ライフサイエンス株式会社**  
茨城県守谷市久保ヶ丘一丁目2番地1

販 売 元  **扶桑薬品工業株式会社**  
大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

### 記

リザルミン注1000（ダルテパリンナトリウム）

#### 1. 改訂箇所

下記の下線部のとおり、[原則禁忌]、[重大な副作用]及び[その他の注意]の項を改訂しました。

#### 2. 改訂内容：薬食安指示及び自主改訂（ \_\_\_\_\_ 部追加箇所、 \_\_\_\_\_ 部削除箇所）

| 改 訂 後                                                                                                                                                                                    | 改 訂 前                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】</b><br>(2) <u>ヘパリン起因性血小板減少症（HIT:heparin-induced thrombocytopenia）の既往歴のある患者</u> [HIT がより発現しやすいと考えられる。]<br><u>（「8.その他の注意」の項（3）参照）</u> | <b>【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】</b><br>追記 |

注）注意—医師等の処方せんにより使用すること

| 【使用上の注意】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 【使用上の注意】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用</p> <p>1) ショック・アナフィラキシー様症状（頻度不明）：ショックが起こることがある。呼吸困難、浮腫等のアナフィラキシー様症状を伴うことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、血圧の維持、体液の補充管理、気道の確保等の適切な処置を行うこと。</p> <p>2) 出血（頻度不明）：頭蓋内出血、消化管出血、後腹膜出血等の重篤な出血があらわれることがあるので、観察を十分に行い、出血又は出血の悪化等異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。血液凝固能が著しく低下し、抗凝血作用を急速に中和する場合は、硫酸プロタミンを投与すること。</p> <p>4) 血栓症（頻度不明）：著明な血小板減少とそれに伴う血栓症の発現が報告されている。<u>ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の場合は、著明な血小板減少と脳梗塞、肺塞栓症、深部静脈血栓症等の血栓症やシャント閉塞、回路内閉塞を伴う。本剤投与後は血小板数を測定し、著明な減少や血栓症を疑わせる異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u></p> <p>8. その他の注意</p> <p>(3) <u>ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）はヘパリンー血小板第4因子複合体に対する自己抗体（HIT抗体）の出現による免疫学的機序を介した病態であり、重篤な血栓症（脳梗塞、肺塞栓症、深部静脈血栓症等）を伴うことがある。HIT発現時に出現するHIT抗体は100日程度で消失～低下するとの報告がある。（「原則禁忌」の項（2）参照）</u></p> | <p>3. 副作用</p> <p>(1) 重大な副作用</p> <p>1) ショック（頻度不明）：ショックが起こることがある。呼吸困難、浮腫等のアナフィラキシー様症状を伴うことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、血圧の維持、体液の補充管理、気道の確保等の適切な処置を行うこと。</p> <p>2) 出血（頻度不明）：脳内出血、消化管出血等の重篤な出血があらわれることがあるので、観察を十分に行い、出血又は出血の悪化等異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。血液凝固能が著しく低下し、抗凝血作用を急速に中和する場合は、硫酸プロタミンを投与すること。</p> <p>4) 血栓症（頻度不明）：著明な血小板減少とそれに伴う血栓症の発現が報告されている。</p> <p>8. その他の注意</p> <p>(3) 追記</p> |

### 3. 改訂理由

**薬食安指示：**厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知（平成18年3月24日付）

原則禁忌に「HITの既往歴のある患者」を追記し、その他の注意に「HITに関する記載」を追記し、注意喚起することにしました。

**自主改訂：**

先発企業の自主改訂に基づき、重大な副作用：ショックの項は「ショック・アナフィラキシー様症状」に変更し、出血に関する記載及び血栓症に関する記載を変更し、注意喚起することにしました。

### 4. 本情報はDSU(医薬品安全対策情報)No. 148(平成18年4月中旬発送予定)に掲載されます。

☆改訂後の【使用上の注意】の全文を次頁以降に掲載しました。

添付文書情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ（URL:<http://www.info.pmda.go.jp>）」においてもご確認いただけます。（掲載まで最大3週間かかる場合があります。）

# リザルミン注1000の「禁忌」、「原則禁忌」、「使用上の注意」（改訂後）

## 【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

## 【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】

- (1)高度な出血症状を有する患者（汎発性血管内血液凝固症(DIC)を除く）[症状が悪化するおそれがある。]
- (2)ヘパリン起因性血小板減少症（HIT：heparin-induced thrombocytopenia）の既往歴のある患者〔HITがより発現しやすいと考えられる。〕（「8. その他の注意」の項(3)参照）
- (3)本剤に過敏症状又は過敏症の既往歴のある患者
- (4)重篤な肝障害又はその既往歴のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある。〕

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用にあたっては、観察を十分に行い、**出血の悪化**がみられた場合には減量又は投与を中止すること。
- (2) 脊椎・硬膜外麻酔あるいは腰椎穿刺等との併用により、穿刺部位に血腫が生じ、神経の圧迫による麻痺があらわれるおそれがある。併用する場合には神経障害の徴候及び症状について十分注意し、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。
- (3) 本剤の抗凝固作用を急速に中和する必要がある場合にはプロタミンを投与する。プロタミン1mgは本剤の100国際単位の効果を抑止する。

### 2. 相互作用

他の薬剤との相互作用は、可能なすべての組合せについて検討されているわけではない。抗凝固療法施行中に新たに他剤を併用したり、休薬する場合には、凝固能の変動に注意すること。

#### 併用注意（併用に注意すること）

| 薬剤名等                                 | 臨床症状・措置方法         | 機序・危険因子                      |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 抗凝固剤<br>ヘパリンナトリウム<br>ワルファリン等         | 出血傾向が増強するおそれがある。  | 相加的に抗凝固作用が増強される。             |
| 血小板凝集抑制作用を有する薬剤<br>アスピリン<br>ジビリダモール等 |                   | 血小板凝集抑制作用を有するため、抗凝固作用が増強される。 |
| テトラサイクリン系抗生物質<br>強心配糖体<br>ジギタリス製剤    | 本剤の作用が減弱するおそれがある。 | 機序不明                         |

### 3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

### (1) 重大な副作用

- 1) **ショック・アナフィラキシー様症状**（頻度不明）：  
ショックが起こることがある。呼吸困難、浮腫等のアナフィラキシー様症状を伴うことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、血圧の維持、体液の補充管理、気道の確保等の適切な処置を行うこと。
- 2) **出血**（頻度不明）：**頭蓋内出血**、**消化管出血**、**後腹膜出血**等の重篤な出血があらわれることがあるので、観察を十分に行い、出血又は出血の悪化等異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。血液凝固能が著しく低下し、抗凝固作用を急速に中和する場合は、硫酸プロタミンを投与すること。
- 3) **血小板減少**（頻度不明）：血小板減少があらわれることがあるので血小板数を測定し、著明な減少が認められた場合には投与を中止すること。
- 4) **血栓症**（頻度不明）：著明な血小板減少とそれに伴う血栓症の発現が報告されている。ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）の場合は、著明な血小板減少と脳梗塞、肺塞栓症、深部静脈血栓症等の血栓症やシャント閉塞、回路内閉塞を伴う。本剤投与後は血小板数を測定し、著明な減少や血栓症を疑わせる異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

### (2) その他の副作用

|                          | 頻度不明                         |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>過敏症</b> <sup>注)</sup> | 痒痒感、発熱、発疹                    |
| <b>肝 臓</b>               | ALT（GPT）の上昇、AST（GOT）、AI-Pの上昇 |
| <b>消 化 器</b>             | 嘔気、食欲不振                      |

注：このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

### 4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので慎重に投与すること。

### 5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

#### (1) 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。〕

#### (2) 授乳婦

投与中は授乳を避けさせること。〔動物実験（ラット）で、乳汁中へ移行することが確認されている。〕

### 6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

### 7. 適用上の注意

#### (1) 調製時

本剤は、抗ヒスタミン剤と混合すると反応し沈殿を生じるおそれがあるので、混注は避けること。

#### (2) 使用後

保存剤を添加していないので、残液を保存使用しないこと。

## 8. その他の注意

- (1) 動物実験での反復投与試験（ラット）において高用量で対照薬（ヘパリン）に比べて軽度の骨多孔症がみられたとの報告がある。
- (2) 外来透析患者では、穿刺部の止血を確認してから帰宅させること。
- (3) ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）はヘパリンー

血小板第4因子複合体に対する自己抗体（HIT抗体）の出現による免疫学的機序を介した病態であり、重篤な血栓症（脳梗塞、肺塞栓症、深部静脈血栓症等）を伴うことがある。HIT発現時に出現するHIT抗体は100日程度で消失～低下するとの報告がある。（「原則禁忌」の項(2)参照）

2006年3月改訂（アンダーラインは追加・変更箇所）