

球形吸着炭細粒「マイラン」を服用される患者さんへ



球形吸着炭細粒「マイラン」は、
腎臓が悪くなるのを遅らせるお薬です。

服用時の注意点

このお薬と他のお薬を服用する場合は、同時に服用しないで、
他のお薬を服用後30分～1時間くらい時間をずらしてから、
このお薬を服用して下さい。

※同時に服用すると、他のお薬の作用を弱めたりするおそれがあります。

飲み忘れに気がついた場合、すぐに1回分を服用して下さい。

ただし、次の服用時間が近い場合は、1回とばして、次の服用時間に1回分
服用して下さい。

2回分を一度に服用しないで下さい。

次のような場合には、早めに主治医または薬剤師にご相談下さい

- ・お薬が飲みにくい時
- ・便秘、吐き気・嘔吐、腹痛、下痢や皮疹、かゆみなどの症状が現れた時
- ・その他、何か気になることや、わからないことがあった時



服用方法

初めに口に少量の水をふくみ、お薬を口の中へ入れ、その後一気に飲み込むようにして下さい。


- ・お薬が気管に入らないように注意して下さい。
- ・入れ歯、歯を治療中の方は、歯の隙間に入らないように注意して下さい。

服用の工夫

薬局・薬店で販売されている「袋オブラート」に移してこのお薬を飲むと上手に服用することができます。

「袋オブラート」を使った球形吸着炭細粒の飲み方

① 球形吸着炭細粒



袋オブラート

お薬を開封し
袋オブラートに移します。

②



オブラートの上部を
ねじって細長くして
飲みやすくします。

③



ねじった袋オブラートを
コップの水にぬれる程度
浸し、そのあと少量の
水とともに服用します。

取扱い

このお薬を机や床にこぼした時は、早めにタオルなどで拭き取るか、掃除機で吸い取るようにして下さい。

なお、皮膚等に触れても、害はありません。