

デュタステリドカプセル0.5mg AV「フソー」 を服用される患者さんへ



このお薬は、**前立腺肥大症を治療するためのお薬**です。
肥大した前立腺を小さくして、尿の通りをよくするお薬です。

服用時の注意点

- カプセルの内容物は、口やノドの粘膜を刺激することがあります。
カプセルを噛んだり、開けたりせずに服用して下さい。
- 飲み忘れに気がついた場合、すぐに1回分を服用して下さい。
ただし、次の服用時間が近い場合は、1回とばして、次の服用時間
に1回分服用して下さい。2回分を一度に服用しないで下さい。

(裏面につづく)

 扶桑薬品工業株式会社

2020年6月作成
DK・211・211A



下記に記入し切り取ってご利用下さい。



デュタステリドカプセル0.5mg AV「フソー」服用カード

医療機関の受診や健康診断などで、**PSA検査**を受ける
ときは、**必ずこのカードをご提示**下さい。

常に携帯
して下さい

お名前

服用を開始した日 年 月 日

服用開始前のPSA値 ng/mL

患者さんへ

このカードに記入後、
ハサミで切り取って
常に携帯して下さい。

PSA検査を受ける
ときは、このカードを
ご提示下さい。



服用中の注意点

- このお薬は、皮膚から吸収されます。女性や小児の方は、カプセルから漏れた薬(内容物)に触れないで下さい。
漏れた薬に触れた場合は、直ちに石鹸と水で洗い流すよう注意して下さい。
- このお薬は、血清前立腺特異抗原*(PSA)値に影響を与えることが知られています。PSA検査を受けるときは(健康診断などのときも)、このお薬を服用中であることを検査を行う先生にお伝えいただくか、下の服用カードを提示して下さい。
*血清前立腺特異抗原(PSA)：前立腺がんのスクリーニングにおける指標
- AGA(男性型脱毛症)の医療用医薬品を服用されている方は、このお薬を服用中であることを医師、薬剤師にお伝え下さい。
- 医師の指示なしに、自分の判断で服用を止めないで下さい。
- このお薬は高温や多湿、直射日光を避けて保管して下さい。

次のような場合には、早めに主治医または薬剤師にご相談下さい

- ・肝機能障害、黄疸(皮膚や粘膜が黄色くなる)
- ・勃起不全、性欲減退
- ・乳房障害(女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感)
- ・その他、何か気になることや、わからないことがあった時

患者さんへ

このカードに記入後、ハサミで切り取って常に携帯して下さい。

PSA検査を受けるときは、このカードをご提示下さい。

下記に記入し切り取ってご利用下さい。

デュタステリドカプセル0.5mg AV「フソー」服用カード

本カードを提示された医療関係者の方へ

この方は前立腺肥大症治療薬(デュタステリド)を服用されています。服用開始から6ヵ月後よりPSA値を約50%減少させる作用がありますので、PSA値をご評価される際は、この点をご考慮いただきますようお願い致します。