


ナフトピジルOD錠 ^{25mg} ^{50mg}「フソー」 ^{75mg} を服用される患者さんへ



このお薬は、前立腺肥大症に伴う排尿障害の治療薬です。

このお薬（OD錠：口腔内崩壊錠）は、水なしでも飲むことができます。水なしで服用する場合は、舌の上のせ唾液で湿らせて、舌で軽くつぶしてから唾液と一緒に飲み込んで下さい。水またはぬるま湯で飲むこともできます。寝たままでは、水なしで飲まないで下さい。

（裏面につづく）

服用時の注意点

- めまい、立ちくらみなどがあらわれることがありますので、高い所での作業や自動車の運転など危険を伴う作業は十分注意して下さい。
- 白内障などの眼科手術の際に、術中虹彩緊張低下症候群があらわれるとの報告がありますので、眼科手術を受ける場合には、この薬を服用しているあるいは以前服用していたことを眼科の医師に伝えて下さい。
- 飲み忘れに気がついた場合、すぐに1回分を服用して下さい。ただし、次の服用時間が近い場合は、1回とばして、次の服用時間に1回分服用して下さい。2回分を1度に服用しないで下さい。

次のような場合には、早めに主治医または薬剤師にご相談下さい

- めまい・ふらつき、立ちくらみ、低血圧（起立性低血圧を含む）
- 胃部不快感
- 発疹、かゆみ、蕁麻疹、多形紅斑
- その他、何か気になることや、わからないことがあった時