

# ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 $\mu$ g「フソー」 を服用される患者さんへ



このお薬は、透析または肝疾患治療を受けておられる方のかゆみを抑えるお薬です。

## 服用時の注意点

- このお薬は、水なしでも飲むことができます。  
水なしで服用する場合は、舌の上のにせ唾液で湿らせて、舌で軽くつぶしてから唾液と一緒に飲み込んで下さい。  
水またはぬるま湯で飲むこともできます。
- このお薬は、1日1回、夕食後又は就寝前に服用するお薬です。  
夕食後の服用指示を受けている方は、飲み忘れに気がついたのが、その日の就寝前であれば、1回分を服用して下さい。  
それ以外の服用指示の場合は、1回とばして、次の服用時間に1回分服用して下さい。2回分を一度に服用しないで下さい。

## 保管時の注意点


- 気温や湿度の高い場所や光のあたる場所を避けて保管して下さい。

(裏面につづく)

## 服用中の注意点

●服用し始めてから、以下のような症状があらわれることがあります。  
このような症状に気が付いたら、医師または薬剤師にご相談下さい。

- 不眠(なかなか寝付けない)
- 便秘
- 頻尿・夜間頻尿  
(肝疾患治療を受けておられる方に注意してほしい症状です)
- 眠気、めまい(フワフワ浮いているようなめまい)



●眠気やめまいなどがあらわれることがありますので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作には従事しないで下さい。

これ以外にも、気になること、わからないことがありましたら、医師または薬剤師にご相談下さい。