

# くすりのしおり

注射剤

2025 年 11 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名:アトロピン硫酸塩注 0.5mg「フソー」

主成分:アトロピン硫酸塩水和物(Atropine sulfate hydrate)

剤形:注射剤

シート記載など:



## この薬の作用と効果について

アトロピンは胃腸管の緊張を低下させ、運動を抑制します。また、心筋に働き心拍数を増加させます。さらに唾液、気管支粘膜、胃液、膵液などの分泌を抑制します。

通常、胃・十二指腸潰瘍における分泌ならびに運動亢進、胃腸の痙攣性疼痛、胆管・尿管の痙攣、痙攣性便秘、迷走神経性徐脈および迷走神経性房室伝導障害、その他の徐脈および房室伝導障害、有機燐系殺虫剤・副交感神経興奮剤の中毒、麻酔前投薬、ECT（電気けいれん療法）の前投与に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。緑内障、前立腺肥大による排尿障害、麻痺性イレウスがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（:医療担当者記入）
- ・通常、皮下、筋肉内または静脈内に注射します。有機リン系殺虫剤中毒の軽症の場合には、皮下注射または経口で服用、中等症の場合には皮下・筋肉内または静脈内に注射、重症の場合には静脈内に注射します。具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

## 生活上の注意

- ・ピントが合わず見えにくい、瞳孔の拡大などがおこることがありますので、注射のあとは自動車の運転や危険を伴う機械の操作はさけてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、散瞳、視調節障害、口渇、吐き気、嚥下障害、便秘、排尿障害、頭痛、頭重感、記憶障害、動悸、呼吸障害、発疹、顔面潮紅などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・頻脈、全身潮紅、発汗、顔面浮腫 [ショック、アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

# Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Injection

Published: 03/2013

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

**Brand name:**Atropine Sulfate Injection 0.5mg "FUSO"

**Active ingredient:**Atropine sulfate hydrate

**Dosage form:**injection

**Print on wrapping:**



## Effects of this medicine

This medicine relieves gastrointestinal tension and suppresses the motility. It also works on myocardium and increases heart rate. Furthermore, it inhibits secretion of saliva, bronchial mucosa, gastric juice, and pancreatic juice etc.

It is usually used for hyper secretion and hyperactivity in gastroduodenal ulcer, gastrointestinal spasmodic pain, bile duct or ureteral pain, spastic constipation, vagal bradycardia and vagus nerve atrioventricular conduction disorder, other bradycardia and atrioventricular conduction disorder, poisoning by organophosphorus insecticides and parasympathomimetic agents, pre-anesthetic medication, and pre-treatment for ECT (electroconvulsive therapy).

## Before using this medicine, be sure to tell your doctor and pharmacist

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines.  
If you have glaucoma, dysuria due to prostatic hypertrophy, or paralytic ileus.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

## Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is(( to be written by a healthcare professional))
- In general, this medicine is injected subcutaneously, intramuscularly or intravenously. For organophosphorus insecticide poisoning, it is injected subcutaneously or taken orally.
- Ask your doctor about treatment duration.

## Precautions while taking this medicine

- This medicine may cause blurred vision and pupil dilation. Avoid driving a car or operating dangerous machinery after injection.

## Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include mydriasis, vision adjustment disorder, glaucoma, dry mouth, nausea, vomiting, swallowing disorder, constipation, urination disorder, headache, dull headache, disturbance of memorization, palpitation, breathing disorder, rash, and facial flushing. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

**The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.**

- tachycardia, generalized flushing, sweating, facial edema [shock, anaphylactoid symptoms]

**The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.**

## Storage conditions and other information

**For healthcare professional use only** / /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.