

くすりのしおり

内服剤

2025 年 06 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名: アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」

主成分: アメジニウムメチル硫酸塩 (Amezinium metilsulfate)

剤形: 白色の錠剤、直径 6.5mm、厚み 2.4mm

シート記載など: [表面] アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」、FS-D10
[裏面] Amezinium Metilsulfate Tablets 10mg "FUSO"、アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」



この薬の作用と効果について

間接的に交感神経機能を亢進させ、血圧を上昇させます。

通常、本態性低血圧、起立性低血圧、透析施行時の血圧低下の改善に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。高血圧症、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、閉塞隅角緑内障、前立腺肥大がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（（ ）：医療担当者記入）
- ・本態性低血圧、起立性低血圧：通常、成人は1回1錠（主成分として10mg）を1日2回服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
透析施行時の血圧低下の改善：通常、成人は透析開始時に1錠（主成分として10mg）を服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついていても、その時は飲まずに、次の服用時間に決められた量を飲んでください。ただし、血液透析を受けている場合は、血液透析の前に気がつけばすぐに飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、動悸、頭痛、吐き気・嘔吐、ほてり感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Internal

Revised: 01/2021

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

Brand name: Amezinium metilsulfate Tablets 10mg "FUSO"

Active ingredient: Amezinium metilsulfate

Dosage form: white tablet, diameter: 6.5 mm, thickness: 2.4 mm

Print on wrapping: (face) アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」, FS-D10
(back) Amezinium Metilsulfate Tab.10mg "FUSO", アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」



Effects of this medicine

This medicine enhances sympathetic nerve function indirectly in order to increase blood pressure. It is usually used to improve essential hypotension, orthostatic hypotension, and decreased blood pressure when receiving dialysis.

Before using this medicine, be sure to tell your doctor and pharmacist

- If you ever experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicine.
- If you are a patient with hypertension, hyperthyroidism, pheochromocytoma, glaucoma, prostatic hypertrophy.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is((to be written by a healthcare professional))
- For the treatment of essential hypotension and orthostatic hypotension: In general, for adults, take 1 tablet (10mg of the active ingredient) at a time, twice a day. The dose may be adjusted according to your age and symptoms. Strictly follow the instructions of your doctor/pharmacist.
- For improvement of decreased blood pressure when receiving dialysis: In general, for adults, take 1 tablet (10mg of the active ingredient) before receiving dialysis. The dose may be adjusted according to your age and symptoms. Strictly follow the instructions of your doctor/pharmacist.
- If you miss a dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. However, if you are a hemodialysis patient and realize that you missed a dose before receiving dialysis, take the missed dose as soon as possible. DO NOT take a double dose to make up for the missed dose.
- If you took too much of this medicine (more than prescribed), consult with your doctor or pharmacist.
- Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

Precautions while taking this medicine

Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include palpitation, headache, nausea/vomiting, glow, rash, eczema and hives. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.

No pertinent entries.

The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.

Storage conditions and other information

- Keep out of the reach of children. Store away from direct sunlight, heat and moisture.
- Discard the remainder. Do not store them.

For healthcare professional use only / /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.