

# くすりのしおり

内服剤

2025年11月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名: ベタメタゾン散 0.1%「フソー」

主成分: ベタメタゾン (Betamethasone)

剤形: 白色の散剤

シート記載など:



## この薬の作用と効果について

体内で作られる副腎皮質ホルモンと似た作用を持ち、抗炎症、抗アレルギー作用を示します。

通常、気管支喘息、リウマチなど内科・小児科、外科ほか広範な病気の治療に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。感染症、全身の真菌症、消化性潰瘍、精神病、結核性疾患、単純疱疹性角膜炎、後嚢白内障、緑内障、高血圧症、電解質異常、血栓症、最近の内臓手術創、急性心筋梗塞がある。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

あなたの用法・用量は(( :医療担当者記入))

- 通常、成人は1日0.5~8g（主成分として0.5~8mg）を1日1~4回に分けて服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まずに、1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- 水痘または麻疹に感染しないように注意し、感染が疑われる場合には直ちに受診してください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、満月様顔貌、不眠、頭痛、めまい、吐き気、食欲不振、下痢、口渴、疲労感、多毛、脱毛、色素沈着、体重増加などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 風邪のような症状、倦怠感、発熱 [誘発感染症、感染症の増悪]
- 全身倦怠感、食欲不振、口渴 [続発性副腎皮質機能不全、糖尿病]
- 吐き気、下血、激しい腹痛 [消化管潰瘍、消化管穿孔]
- 激しい上腹部の痛み、発熱、吐き気 [膵炎]
- 気分が変わりやすい、やる気がしない、不眠 [精神変調、うつ状態、痙攣]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1~30℃）で保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。
- 生ワクチンの接種を受ける時は、必ず医師に相談してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

# Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Internal

Revised: 11/2025

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

## Brand name:Betamethasone Powder 0.1% "FUSO"

**Active ingredient:**Betamethasone

**Dosage form:**white powder

**Imprint or print on wrapping:**



## Effects of this medicine

This medicine has an action similar to that of the adrenal cortical hormone produced in the body, and exhibits anti-inflammatory and anti-allergic effects.

It is usually used to treat a wide range of illnesses including bronchial asthma and rheumatism in internal medicine, pediatrics, surgery, and other fields.

## The following patients may need to be careful when using this medicine. Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.
- If you have: infectious diseases, systemic mycosis, digestive ulcer, psychiatric illness, tuberculous disease, herpes simplex keratitis, posterior capsular cataract, glaucoma, hypertension, electrolyte abnormality, thrombosis, recent visceral surgical wound, or acute myocardial infarction.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

## Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is(( to be written by a healthcare professional))
- In general, for adults, take 0.5 g to 8 g (0.5 mg to 8 mg of the active ingredient) in 1 to 4 divided doses. The dosage may be adjusted according to age or symptoms. Strictly follow the instructions.
- If you miss a dose, take the missed dose as soon as possible. However, if it is almost time for next dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. You should never take two doses at one time.
- If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist.
- Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

## Precautions while taking this medicine

- Be careful to avoid contracting chickenpox or measles, and seek medical attention immediately if you suspect you have been infected.

## Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include rash, moon face, insomnia, headache, dizziness, nausea, loss of appetite, diarrhea, dry mouth, fatigue, excessive hair growth, hair loss, pigmentation, and weight gain. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

## The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.

- cold-like symptoms, malaise, fever [induced infection, exacerbation of infection]
- general malaise, loss of appetite, dry mouth [secondary adrenal cortical insufficiency, diabetes mellitus]
- nausea, melena, severe abdominal pain [peptic ulcer, gastrointestinal perforation]
- severe pain in the upper abdomen, fever, nausea [pancreatitis]
- mood swings, have no energy, sleeplessness [mental abnormality, depression, convulsion]

## The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.

## Storage conditions and other information

- Keep out of the reach of children. Store at room temperature (1 to 30 degrees Celsius) away from direct sunlight and moisture.
- Discard the remainder. Do not store them. If you do not know how to discard, seek advice of your pharmacy or medical institution. Do not give the unused medicines to others.
- Always consult your doctor before receiving a live vaccine.

## For healthcare professional use only

/ /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.