

くすりのしおり

注射剤

2025 年 06 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名: ビーシックス注「フソー」-30mg

主成分: ピリドキシン塩酸塩 (Pyridoxine Hydrochloride)

剤形: 注射剤

シート記載など:



この薬の作用と効果について

ビタミン B₆ 製剤で、補酵素として生体内の代謝（アミノ酸、脂質、糖などの代謝）に関与します。通常、ビタミン B₆ 欠乏症の予防および治療、ビタミン B₆ の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給、ビタミン B₆ 依存症、ビタミン B₆ の欠乏または代謝障害に関与すると推定される諸症状（口角炎、急・慢性湿疹、末梢神経炎など）に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（: 医療担当者記入）
 - ・通常、成人は 1 日 1～2 回皮下、筋肉内または静脈内に注射します。
- 具体的な投与期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、光線過敏症、末梢神経障害（手足のしびれ、知覚異常）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・手足の筋肉の痛み、脱力感、赤褐色尿 [横紋筋融解症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。