

くすりのしおり

注射剤

2025年08月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名:バイオゲン静注 50mg

主成分:チアミンジスルファード(Thiamine disulfide)
グлюコーズ(Glucose)



剤形:注射剤

シート記載など:

この薬の作用と効果について

チアミンジスルファードはチアミン（ビタミンB₁）に代謝され、代謝酵素の補酵素として作用します。

通常、ビタミンB₁欠乏症の予防および治療、ビタミンB₁の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給、ウェルニッケ脳炎、脚気衝心、ビタミンB₁の欠乏または代謝障害が関与すると推定される諸症状（神経痛、筋肉痛・関節痛、末梢神経炎・末梢神經麻痺、便秘などの胃腸運動機能障害、術後腸管麻痺）に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は((:医療担当者記入))
・通常、緩徐に静脈内に注射します。具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、吐き気などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・血圧が下がる、胸が苦しい、呼吸をしにくい [ショック]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Injection

Revised: 08/2025

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

Brand name: Biogen Injection 50mg

Active ingredient: Thiamine disulfide
Glucose



Dosage form: injection

Imprint or print on wrapping:

Effects of this medicine

Thiamine disulfide is metabolized to thiamine (vitamin B₁) and acts as a coenzyme for metabolic enzymes. It is usually used to prevent and treat vitamin B₁ deficiency, to supplement when dietary intake is insufficient due to increased vitamin B₁ demand, and to treat Wernicke's encephalitis, heart failure from beriberi, and various symptoms thought to be related to vitamin B₁ deficiency or metabolic disorders (nerve pain, muscle pain / joint pain, peripheral neuritis / peripheral nerve palsy, gastrointestinal motility disorders such as constipation, and postoperative intestinal palsy).

The following patients may need to be careful when using this medicine. Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is((to be written by a healthcare professional))
- In general, this medicine is administered by slow intravenous injection.
Ask your doctor about the specific duration of use.

Precautions while taking this medicine

Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include rash and nausea. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.

- decreased blood pressure, chest distress, breathing difficulty [shock]

The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.

Storage conditions and other information

For healthcare professional use only / /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.