

# くすりのしおり

内服剤

2025 年 08 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名: ポリスチレンスルホン酸 Ca「フソー」原末

主成分: ポリスチレンスルホン酸カルシウム (Calcium polystyrene sulfonate)

剤形: 微黄白色～淡黄色の粉末

シート記載など: 高カリウム血症改善薬、ポリスチレンスルホン酸 Ca「フソー」原末、5g、Calcium Polystyrene Sulfonate “FUSO”、FS-K09



## この薬の作用と効果について

カルシウム型陽イオン交換樹脂で、イオン交換によりカルシウムとカリウムのイオンを交換し、高くなったカリウムイオンを体外に排出させます。

通常、急性および慢性腎不全に伴う高カリウム血症の治療に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腸閉塞、便秘傾向、腸管狭窄、消化管潰瘍、副甲状腺機能亢進症、多発性骨髄腫がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（: 医療担当者記入）
- ・通常、成人は 1 日 15～30g を 2～3 回に分け、その 1 回量を水 30～50mL にかき混ぜて服用しますが、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで 1 回分を飛ばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、便秘、胃部不快感、吐き気、食欲不振などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・便秘、激しい腹痛、吐き気、下血 [腸管穿孔、腸閉塞、大腸潰瘍]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

# Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Internal

Revised: 08/2025

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

**Brand name:** Calcium Polystyrene Sulfonate "FUSO" Powder

**Active ingredient:** Calcium polystyrene sulfonate

**Dosage form:** faintly yellowish white to pale yellow powder

**Imprint or print on wrapping:** 高カリウム血症改善薬, ポリスチレンスルホン酸 Ca「フソ」原末, 5g, Calcium Polystyrene Sulfonate "FUSO", FS-K09



## Effects of this medicine

This medicine is calcium type of cation-exchange resin which exchanges potassium ions for calcium ions, and excretes excess potassium ions.

It is usually used to treat hyperkalemia due to acute or chronic renal failure.

## The following patients may need to be careful when using this medicine. Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.
- If you have intestinal obstruction, tendency of constipation, intestinal stenosis, gastrointestinal ulcer, hyperparathyroidism or multiple myeloma.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

## Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is(( to be written by a healthcare professional))
- In general, for adults, take 15 to 30 g a day in 2 to 3 divided doses, by suspending the one divided amount in 30 to 50 mL of water. The dosage may be adjusted according to your symptoms. Strictly follow the instructions.
- If you miss a dose, take the missed dose as soon as possible. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and follow your regular dosing schedule. You should never take two doses at one time.
- If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist.
- Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

## Precautions while taking this medicine

## Possible adverse reactions to this medicine

The most commonly reported adverse reactions include constipation, stomach discomfort, nausea, and loss of appetite. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.

**The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.**

- constipation, severe abdominal pain, nausea, melena [intestinal perforation, intestinal obstruction, large intestine ulcer]

**The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.**

## Storage conditions and other information

- Keep out of the reach of children. Store at room temperature (1 to 30 degrees Celsius) away from direct sunlight and moisture.
- Discard the remainder. Do not store them. If you do not know how to discard, seek advice of your pharmacy or medical institution. Do not give the unused medicines to others.

## For healthcare professional use only

For further information, talk to your doctor or pharmacist.