

くすりのしおり

注射剤

2025 年 09 月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名: サブラッド血液ろ過用補充液 BSG

主成分: 塩化ナトリウム (Sodium chloride)
塩化カリウム (Potassium chloride)
塩化カルシウム水和物 (Calcium chloride hydrate)
塩化マグネシウム (Magnesium chloride)
無水酢酸ナトリウム (Anhydrous sodium acetate)
ブドウ糖 (Glucose)
炭酸水素ナトリウム (Sodium bicarbonate)

剤形: 注射剤

シート記載など:



この薬の作用と効果について

血液透析時の電解質・酸塩基平衡異常、水分過剰状態を是正し、血糖を維持します。
通常、血液ろ過または血液ろ過透析で、ろ過された体液の補充に使用されます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を飲んで、または注射を受けて、発しんやかゆみなどが出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（（
: 医療担当者記入））
- ・通常、透析回路中に使用します。
- ・通常の血液ろ過では 4～7 時間使用します。また血液ろ過透析の場合では 3～5 時間使用します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

血液ろ過、血液ろ過透析の副作用として、低血圧、ショック、不均衡症候群（頭痛、吐き気、痙攣、胸が苦しい、全身倦怠感）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。