

くすりのしおり

内服剤

2025年12月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名: 塩化カリウム「フソー」

主成分: 塩化カリウム (Potassium chloride)

剤形: 無色または白色の粉末

シート記載など:



この薬の作用と効果について

体内的不足したカリウムを補給します。

通常、カリウム補給（降圧利尿剤、副腎皮質ホルモン、強心配糖体、インスリン、ある種の抗生物質などの連用時。低カリウム血症型周期性四肢麻痺。重症嘔吐、下痢、カリウム摂取不足および手術後。）、低クロール性アルカローシスに用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腎機能障害（1日の尿の回数や1回の尿量が少ない）、副腎機能障害（アジソン病）、高カリウム血症、消化管の通過障害（心肥大、食道癌、胸部大動脈瘤、逆流性食道炎、心臓手術などによる食道圧迫のため食道が狭くなっている。消化管狭窄または消化管運動機能不全がある。）、高カリウム血性周期性四肢麻痺がある。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

あなたの用法・用量は((

:医療担当者記入))

- 通常、成人は1日主成分として2~10gを数回に分け、多量の水とともに服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

該当する記載事項はありません。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 吐き気、腹痛、腹部膨満感、黒色便 [消化管の閉塞、潰瘍、穿孔]
- 動悸、胸の不快感、胸の痛み [心臓伝導障害]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1~30℃）で保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

医療担当者記入欄

年　　月　　日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")

Internal

Revised: 12/2025

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

Brand name:POTASSIUM CHLORIDE "FUSO"

Active ingredient:Potassium chloride

Dosage form:colorless or white powder

Imprint or print on wrapping:



Effects of this medicine

This medicine supplies potassium.

It is usually used for potassium supplementation (when you are continuously taking antihypertensive diuretic, corticosteroid, cardiac glycoside, insulin or any antibiotics. If you have hypokalemic periodic paralysis. If you have severe vomiting, diarrhea, insufficient intake of potassium and is in a postoperative state.), it is also used for hypochloremic alkalosis.

The following patients may need to be careful when using this medicine. Be sure to tell your doctor and pharmacist.

- If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines or foods.
- If you have renal dysfunction (frequency of urine per day is low, or the volume of urine is low), adrenal dysfunction (Addison's disease), hyperkalemia, gastrointestinal obstruction (esophagus is squeezed and narrow due to cardiac hypertrophy, esophageal cancer, thoracic aortic aneurysm, reflux esophagitis, or heart surgery).
- If you have gastrointestinal stricture or gastrointestinal dysfunction., hyperkalemic periodic paralysis.
- If you are pregnant or breastfeeding.
- If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)

Dosing schedule (How to take this medicine)

- Your dosing schedule prescribed by your doctor is((to be written by a healthcare professional))
- In general, for adults, take 2 to 10 g of the active ingredient in several divided doses a day, with a large amount of water. The dosage may be adjusted according to disease, age and symptoms of the patient. Strictly follow the instructions.
- If you miss a dose, take a dose as soon as you remember. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and follow your regular dosing schedule. You should never take two doses at one time.
- If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist.
- Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so.

Precautions while taking this medicine

Possible adverse reactions to this medicine

No pertinent entries.

The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor immediately.

- nausea, abdominal pain, abdominal bloating and black stool [gastrointestinal obstruction, ulcer, perforation]
- palpitation, chest discomfort and chest pain [cardiac conduction disorder]

The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.

Storage conditions and other information

- Keep out of the reach of children. Store at room temperature (1 to 30 degrees Celsius) away from direct sunlight and moisture.
- Discard the remainder. Do not store them. If you do not know how to discard, seek advice of your pharmacy or medical institution. Do not give the unused medicines to others.

For healthcare professional use only

/ /

For further information, talk to your doctor or pharmacist.