

貯 法 : 室温保存
有効期間 : 3年

持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤

日本標準商品分類番号
872144、872179

日本薬局方 エナラプリルマレイン酸塩錠

エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フゾー」

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フゾー」

エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フゾー」

ENALAPRIL MALEATE TABLETS

	2.5mg	5mg	10mg
承認番号	22800AMX00446	22800AMX00445	22800AMX00447
販売開始	2000年7月		2010年11月

処方箋医薬品^{注)}

注) : 注意—医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 血管性浮腫の既往歴のある患者(アンジオテンシン変換酵素阻害剤等の薬剤による血管性浮腫、遺伝性血管性浮腫、後天性血管性浮腫、特発性血管性浮腫等)【高度の呼吸困難を伴う血管性浮腫を発現することがある。】
- 2.3 デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフェレーシスを施行中の患者[10.1 参照]
- 2.4 アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜(AN69)を用いた血液透析施行中の患者[10.1、13.2 参照]
- 2.5 妊婦又は妊娠している可能性のある女性[9.5 参照]
- 2.6 アリスキレンを投与中の糖尿病患者(ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く)[10.1 参照]
- 2.7 アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬(サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物)を投与中の患者、あるいは投与中止から36時間以内の患者[10.1 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フゾー」	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フゾー」	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フゾー」
有効成分	1錠中 日局 エナラプリルマレイン酸塩 2.5mg	1錠中 日局 エナラプリルマレイン酸塩 5mg	1錠中 日局 エナラプリルマレイン酸塩 10mg
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、アルファ-化デンプン、炭酸水素ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、アルファ-化デンプン、炭酸水素ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、アルファ-化デンプン、炭酸水素ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄

3.2 製剤の性状

販売名	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フゾー」	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フゾー」	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フゾー」
色・剤形	白色の素錠	うすい桃色の素錠(割線入り)	うすい桃色の素錠(割線入り)
外形			
大 き さ	直径 (mm)	6.5	6.5
厚さ (mm)	厚さ (mm)	2.3	3.2
質量 (mg)	質量 (mg)	100	200
識別コード	DK403	DK404	DK502

4. 効能又は効果

- 本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症、悪性高血圧
- 下記の状態で、ジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分な効果が認められない場合
慢性心不全(軽症～中等症)

5. 効能又は効果に関する注意

〈慢性心不全(軽症～中等症)〉

- 5.1 ジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤で十分な効果が認められない患者にのみ、本剤を追加投与すること。なお、本剤の単独投与での有用性は確立されていない。
- 5.2 重症の慢性心不全に対する本剤の有用性は確立されていない。使用経験が少ない。

6. 用法及び用量

〈高血圧症〉

通常、成人に対しエナラプリルマレイン酸塩として5～10mgを1日1回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

但し、腎性・腎血管性高血圧症又は悪性高血圧の患者では2.5mgから投与を開始することが望ましい。

通常、生後1ヵ月以上的小児には、エナラプリルマレイン酸塩として0.08mg/kgを1日1回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈慢性心不全(軽症～中等症)〉

本剤はジギタリス製剤、利尿剤等と併用すること。

通常、成人に対しエナラプリルマレイン酸塩として5～10mgを1日1回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

但し、腎障害を伴う患者又は利尿剤投与中の患者では2.5mg(初回量)から投与を開始することが望ましい。

7. 用法及び用量に関する注意

小児等に投与する場合には、1日10mgを超えないこと。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 初回投与後、一過性の急激な血圧低下を起こす場合があるので、血圧等の観察を十分に行うこと。

- 8.2 手術前24時間は投与しないことが望ましい。アンジオテンシン変換酵素阻害剤投与中の患者は、麻酔及び手術中にレニン・アンジオテンシン系の抑制作用による血圧低下を起こすおそれがある。

- 8.3 降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意せること。

- 8.4 急性腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査を実施するなど観察を十分に行うこと。[11.1.4 参照]

- 8.5 重篤な血液障害があらわれることがあるので、定期的に検査を実施するなど観察を十分に行うこと。[11.1.5 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

〈効能共通〉

- 9.1.1 両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがある。

9.1.2 高カリウム血症の患者

治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。高カリウム血症を増悪させるおそれがある。

また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、血清カリウム値に注意すること。

9.1.3 脳血管障害のある患者

過度の降圧が脳血流不全を惹起し、病態を悪化させことがある。

9.1.4 厳重な減塩療法中の患者

本剤の投与を低用量から開始し、增量する場合は徐々に行うこと。
初回投与後、一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがある。

〈高血圧症〉

9.1.5 重症の高血圧症患者

本剤の投与を低用量から開始し、增量する場合は徐々に行うこと。
初回投与後、一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがある。

9.2 腎機能障害患者

〈効能共通〉

9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者

クレアチニンクリアランスが30mL/min以下、又は血清クレアチニンが3mg/dL以上の場合には、投与量を減らすか、もしくは投与間隔をのばすなど慎重に投与すること。本剤の活性代謝物の血中濃度が上昇し、過度の血圧低下、腎機能の悪化が起きるおそれがある。

〈高血圧症〉

9.2.2 血液透析中の患者

本剤の投与を低用量から開始し、增量する場合は徐々に行うこと。
初回投与後、一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがある。

〈慢性心不全（軽症～中等症）〉

9.2.3 腎障害のある患者

本剤の投与を低用量から開始し、增量する場合は徐々に行うこと。
初回投与後、一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがある。

9.4 生殖能を有する者

9.4.1 妊娠する可能性のある女性

妊娠していることが把握されずアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を使用し、胎児・新生児への影響（腎不全、頭蓋・肺・腎の形成不全、死亡等）が認められた例が報告されている^{1,2)}。

本剤の投与に先立ち、代替薬の有無等も考慮して本剤投与の必要性を慎重に検討し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。また、投与が必要な場合には次の注意事項に留意すること。[9.5 参照]

(1) 本剤投与開始前に妊娠していないことを確認すること。本剤投与中も、妊娠していないことを定期的に確認すること。
投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。

(2) 次の事項について、本剤投与開始時に患者に説明すること。
また、投与中も必要に応じ説明すること。

- ・妊娠中に本剤を使用した場合、胎児・新生児に影響を及ぼすリスクがあること。
- ・妊娠が判明した又は疑われる場合は、速やかに担当医に相談すること。
- ・妊娠を計画する場合は、担当医に相談すること。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。
投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。妊娠中期及び末期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤を投与された患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の変形、肺の低形成等があらわれたとの報告がある。また、海外で実施されたレトロスペクティブな疫学調査で、妊娠初期にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された患者群において、胎児奇形の相対リスク

は降圧剤が投与されていない患者群に比べ高かったとの報告がある。[2.5、9.4.1 参照]

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行することが報告されている。

9.7 小児等

低出生体重児、新生児及びeGFRが30mL/min/1.73m²未満の小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

低用量から投与を開始するなど慎重に投与すること。一般に過度の降圧は好ましくないとされている。脳梗塞等が起こるおそれがある。

10. 相互作用

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
デキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテフラーートを用いた吸着器によるアフェーレーシスの施行： リボソーパー イムソーパTR セルソーパ等	[2.3 参照]	陰性に荷電したデキストラン硫酸固定化セルロース、トリプトファン固定化ポリビニルアルコール又はポリエチレンテフラーートにより血中キニン系の代謝が亢進し、プラジキニン産生が増大する。更にACE阻害薬はプラジキニンの代謝を阻害するため、プラジキニンの蓄積が起こると考えが報告されている。
アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜を用いた透析： AN69	[2.4、13.2 参照]	多価イオン体であるAN69により血中キニン系の代謝が亢進し、本剤によりプラジキニンの代謝が妨げられ蓄積すると考えられている。
アリスキレンラジレス（糖尿病患者に使用する場合。ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く。）	[2.6 参照]	レニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
* アンジオテンシン受容体ネブリライシン阻害薬（ARNI）： サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物 エンレスト	[2.7 参照]	併用により相加的にプラジキニンの分解が抑制され、プラジキニンの血中濃度が上昇する可能性がある。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤： スピロノラクトン トリアムテレン カリウム補給剤： 塩化カリウム トリメトプリム含有製剤： スルファメトキサゾール・トリメトプリム	血清カリウム値が上昇することがある。	本剤はアルドステロン分泌抑制に基づく尿中のカリウム排泄抑制作用を有するため、併用によりカリウム貯留作用が増強する。腎機能障害のある患者には特に注意すること。
リチウム： 炭酸リチウム	リチウム中毒が報告されている。血中リチウム濃度に注意すること。	本剤のナトリウム排泄作用により、リチウムの蓄積が起こると考えられている。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アリスキレン	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。eGFRが60mL/min/1.73m ² 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	レニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある。	
利尿降圧剤、利尿剤：ヒドロクロロチアジド	初回投与後、一過性の急激な血圧低下を起こすおそれがある。本剤の投与を低用量から開始し、增量する場合は徐々に行うこと。	利尿降圧剤服用中の患者では、ナトリウム利尿により血中レニン活性が上昇し、本剤の降圧効果が増強することがある。本剤より先に利尿降圧剤を投与中の患者（特に最近投与を開始した患者）には特に注意すること。
カリジノゲナーゼ製剤	過度の血圧低下が引き起こされる可能性がある。	本剤のキニン分解抑制作用とカリジノゲナーゼ製剤のキニン産生作用により、血中キニン濃度が増大し血管平滑筋の弛緩が増強される可能性がある。
ニトログリセリン	降圧作用が増強されることがある。	機序不明
非ステロイド性消炎鎮痛剤：インドメタシン等	降圧作用が減弱されることがある。	インドメタシンは血管拡張作用を有するプロスタグランジンE ₂ 、I ₂ の生成を抑制するため、本剤のプロスタグランジン生成促進作用による降圧作用を減弱させる可能性があると考えられている。
リファンビシン	降圧作用が減弱されることがある。	機序不明
* ピルダグリブチン	血管性浮腫のリスクが増加するおそれがある。	機序不明

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

*11.1.1 血管性浮腫（頻度不明）

呼吸困難を伴う顔面、舌、声門、喉頭の腫脹を症状とする血管性浮腫があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、アドレナリン注射、気道確保等適切な処置を行うこと。また、腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等を伴う腸管血管性浮腫があらわれることがある。

11.1.2 ショック（頻度不明）

11.1.3 心筋梗塞、狭心症（いずれも頻度不明）

11.1.4 急性腎障害（頻度不明）

[8.4 参照]

11.1.5 汗血球減少症、無顆粒球症、血小板減少（いずれも頻度不明）

[8.5 参照]

11.1.6 膜炎（頻度不明）

血中のアミラーゼ、リパーゼの上昇等があらわれることがある。

11.1.7 間質性肺炎（頻度不明）

発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがある。

11.1.8 剥脱性皮膚炎、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症

候群）、天疱瘡（いずれも頻度不明）

11.1.9 錯乱（頻度不明）

11.1.10 肝機能障害、肝不全（いずれも頻度不明）

11.1.11 高カリウム血症（0.8%）

11.1.12 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）（頻度不明）
低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）があらわれた場合には、投与を中止し、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
腎臓 クレアチニン上昇		BUN 上昇	
血液 貧血、白血球減少			ヘモグロビン低下、ヘマトクリット低下、好酸球增多
皮膚 発疹、そう痒		荨麻疹	光線過敏症、多汗、脱毛
精神神経系 めまい、頭痛、眠気		不眠	いらいら感、抑うつ
循環器 低血圧、動悸、胸痛			起立性低血圧、調律障害（頻脈、徐脈）
消化器 腹痛、食欲不振、嘔気、下痢、消化不良、口内炎		嘔吐	舌炎、便秘
肝臓 AST上昇、ALT上昇			黄疸
呼吸器 咳嗽、咽（喉）頭炎			喘息、嗄声
その他 倦怠感、ほてり、口渴、味覚異常、脱力感、しびれ		発熱、血清ナトリウム値低下	潮紅、疲労、インボデンス、耳鳴、筋肉痛、低血糖

13. 過量投与

13.1 症状

主な症状は、過度の低血圧である。

13.2 処置

過度の低血圧に対しては、生理食塩液の静脈注射等適切な処置を行うこと。本剤の活性代謝物は、血液透析により血中から除去できる。ただし、アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜（AN69）を用いた血液透析を行わないこと。

[2.4、10.1 参照]

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 インスリン又は経口血糖降下剤の投与中にアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与することにより、低血糖が起こりやすいとの報告がある。

15.1.2 外国において、本剤服用中の患者が膜翅目毒（ハチ毒）による脱感作中にアナフィラキシーを発現したとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人にエナラプリルマレイン酸塩5及び10mgを1回経口投与した場合、速やかに吸収され、活性体ジアシド体の血漿中濃度は投与約4時間でピークに達し、半減期は約14時間である³⁾。


16.1.2 反復投与

健康成人にエナラプリルマレイン酸塩5及び10mgを1日1回7日間連続経口投与した場合の血漿中濃度から、蓄積性は認められない⁴⁾。

16.1.3 生物学的同等性試験

〈エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」〉

エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」とレニベース錠2.5を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（エナラブリルマレイン酸塩として2.5mg）を健康成人男性に絶食時に単回経口投与して血清中活性代謝物ジアシド体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（ C_{max} 、AUC）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された⁵⁾。




	判定パラメータ		参考パラメータ	
	C_{max} (ng/mL)	AUC_{0-48hr} (ng·hr/mL)	T_{max} (hr)	$T_{1/2}$ (hr)
エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「フソー」	9.19±5.15	98.85±40.53	6.2±1.2	10.8±3.3
レニベース錠2.5	8.01±4.09	91.19±31.26	6.1±1.0	10.2±4.0

平均±標準偏差 (n=20)

血清中濃度並びに C_{max} 、AUC等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

〈エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」〉

エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」とレニベース錠5を、クロスオーバー法によりそれぞれ2錠（エナラブリルマレイン酸塩として10mg）を健康成人男性に絶食時に単回経口投与して血清中活性代謝物ジアシド体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（ C_{max} 、AUC）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された⁶⁾。



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	C_{max} (ng/mL)	AUC_{0-48hr} (ng·hr/mL)	T_{max} (hr)	$T_{1/2}$ (hr)
エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」	92.79±24.61	710.7±224.3	3.9±0.8	10.7±12.4
レニベース錠5	96.31±26.81	706.6±222.8	3.5±0.5	12.8±13.4

平均±標準偏差 (n=14)

血清中濃度並びに C_{max} 、AUC等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.5 排泄

健康成人にエナラブリルマレイン酸塩5及び10mgを1回経口投与した場合、主に尿中に排泄され、投与後48時間までの総エナラブリルマレイン酸塩（未変化エナラブリルマレイン酸塩+ジアシド体）の尿中排泄率は約52及び64%である³⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 慢性腎不全患者

腎機能正常な本態性高血圧症患者及び慢性腎不全を伴う本態性高血圧症患者にエナラブリルマレイン酸塩10mgを1回経口投与した場合、慢性腎不全患者の血漿中濃度は、腎機能正常患者に比べ半減期の延長、最高血中濃度と血中濃度曲線下面積の増大が認められる⁷⁾。

16.6.2 小児

生後2ヵ月～15歳の小児の高血圧症患者に、エナラブリルマレイン酸塩（6歳未満：0.15mg/kg、6歳以上で体重28kg未満：2.5mg、6歳以上で体重28kg以上：5mg、12歳以上：5mg）^{注)}を1日1回7日間反復経口投与した試験において、活性体ジアシド体のAUC_{0-24hr}及び C_{max} は年齢によらず同程度であった。体重あたりの用量に換算したAUC_{0-24hr}及び C_{max} は年齢に伴って増加したが、体表面積あたりの用量に換算したAUC_{0-24hr}及び C_{max} に増加は認められなかった。定常状態で活性体ジアシド体の半減期は14時間であった（外国人データ）⁸⁾。

16.8 その他

〈エナラブリルマレイン酸塩錠10mg「フソー」〉

エナラブリルマレイン酸塩錠10mg「フソー」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「フソー」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判断され、生物学的に同等とみなされた⁹⁾。

注) 高血圧症について、本剤の承認された小児の用量は、生後1ヵ月以上の小児にはエナラブリルマレイン酸塩として0.08mg/kgである。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈高血圧症〉

17.1.1 国内臨床試験

軽・中等症本態性高血圧症患者を対象とした二重盲検比較試験及び重症本態性高血圧症患者を対象とした比較試験の結果、エナラブリルマレイン酸塩の有用性が認められている^{10,11)}。

〈慢性心不全〉

17.1.2 国内臨床試験

国内44施設で実施されたプラセボを対照とした二重盲検比較試験（全般改善度解析対象128例）において、改善以上の改善率は49%（32/65例）であり、プラセボに比べ有意に優れており、エナラブリルマレイン酸塩の有用性が認められている¹²⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

〈高血圧症〉

18.1.1 エナラブリルマレイン酸塩は経口吸収後ジアシド体に加水分解され、このジアシド体がアンジオテンシン変換酵素を阻害し、生理的昇圧物質であるアンジオテンシンIIの生成を抑制することによって降圧効果を発揮する¹³⁾。

〈慢性心不全〉

18.1.2 エナラブリルマレイン酸塩の活性体であるジアシド体が、亢進したレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系を抑制することによって、主に末梢血管抵抗を減少させ、前負荷及び後負荷を軽減する。その結果、血行動態が改善され、心拍出量の増大あるいは長期投与による延命効果、心肥大の改善が認められる¹⁴⁾。

18.2 高血圧に対する作用

18.2.1 アンジオテンシン変換酵素阻害作用

in vitro 試験においてエナラプリルマレイン酸塩のジアシド体はブタの血漿から精製したアンジオテンシン変換酵素、正常血圧ラットの血漿及び組織中のアンジオテンシン変換酵素に対して強い阻害作用を示す。また、ラット及びイヌにエナラプリルマレイン酸塩を経口投与すると外因性のアンジオテンシン I に対する昇圧反応を抑制する¹⁵⁾。

18.2.2 降圧作用

(1) エナラプリルマレイン酸塩は高血圧自然発症ラット、1腎型

腎性高血圧ラット、2腎型腎性高血圧ラットの血圧を下降させ、その作用はカプトプリルの約3倍強い。なお、その降圧効果は2腎型腎性高血圧ラットにおいて特に著明である。また、ヒドロクロロチアジドとの併用により降圧効果の増強を示す^{13, 16)}。

(2) エナラプリルマレイン酸塩を2腎型腎性高血圧ラット、高血圧自然発症ラットに連続経口投与すると投与期間中安定した降圧効果が得られ、また、投与中止に伴う血圧のリバウンド現象は生じない^{16, 17)}。

18.3 慢性心不全に対する作用

18.3.1 血行動態に及ぼす影響

(1) ラットの慢性心不全モデルにおいて、ジアシド体は心拍数、心収縮性にはほとんど影響を与えることなく、前負荷（左室拡張末期圧）及び後負荷（平均動脈圧）を軽減させ、心機能を改善する¹⁸⁾。

(2) イヌの慢性心不全モデルにおいて、エナラプリルマレイン酸塩は心拍数にはほとんど影響を与えることなく、末梢血管抵抗を減少させ、心拍出量を増大させる¹⁹⁾。

なお、イヌの急性心不全モデルにおいて、ジアシド体は、上昇した血漿アンジオテンシンII及びアルドステロン濃度を抑制することによって、前負荷（肺動脈楔入圧）及び後負荷（平均動脈圧）を軽減し、心拍出量を増大させることが認められる²⁰⁾。

18.3.2 延命効果

ラットの慢性心不全モデルにおいて、エナラプリルマレイン酸塩を1年間経口投与した結果、対照群に比べ生存期間なし生存率が有意に増加し、さらに心肥大が改善する^{21, 22)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：エナラプリルマレイン酸塩（Enalapril Maleate）


化学名：(2S)-1-{(2S)-2-[(1S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino]propanoyl}pyrrolidine-2-carboxylic acid monomaleate

分子式：C₂₀H₂₈N₂O₅・C₄H₄O₄

分子量：492.52

融点：約145°C（分解）

化学構造式：



性状：白色の結晶又は結晶性の粉末である。

メタノールに溶けやすく、水又はエタノール（99.5）にやや溶けにくく、アセトニトリルに溶けにくい。

20. 取扱い上の注意

開封後は湿気を避けて保存すること。

* * 22. 包装

〈エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フロー」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

500錠 [10錠 (PTP) × 50、乾燥剤入り]

〈エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フロー」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

〈エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フロー」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10、乾燥剤入り]

23. 主要文献

- 1) 阿部真也 他：周産期医学. 2017 ; 47 : 1353-1355
- 2) 齋藤大祐 他：鹿児島産科婦人科学会雑誌. 2021 ; 29 : 49-54
- 3) 中島光好 他：薬理と治療. 1984 ; 12 : 3357-3374
- 4) 中島光好 他：薬理と治療. 1984 ; 12 : 3375-3400
- 5) 社内資料：生物学的同等性試験（エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「フロー」）
- 6) 社内資料：生物学的同等性試験（エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「フロー」）
- 7) 塩之入洋 他：日本腎臓学会誌. 1985 ; 27 : 1291-1297
- 8) Wells T, et al. : J Clin Pharmacol. 2001 ; 41 : 1064-1074
- 9) 社内資料：生物学的同等性試験（エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「フロー」）
- 10) 吉利和 他：臨床評価. 1985 ; 13 : 333-379
- 11) 吉利和 他：臨床評価. 1985 ; 13 : 613-658
- 12) 新谷博一 他：医学のあゆみ. 1990 ; 152 : 677-692
- 13) 第十八改正日本薬局方解説書. 廣川書店, 2021 : C978-C984
- 14) 田中千賀子 他編：NEW 薬理学. 改訂第7版, 南江堂, 2017 : 389-390, 404-405
- 15) Gross DM, et al. : J Pharmacol Exp Ther. 1981 ; 216 : 552-557
- 16) 大村一平 他：日薬理誌. 1985 ; 86 : 293-302
- 17) 大村一平 他：日薬理誌. 1985 ; 86 : 303-313
- 18) Emmert SE, et al. : Clin Exp Hypertens A. 1987 ; 9 : 297-306
- 19) Leddy CL, et al. : J Clin Pharmacol. 1983 ; 23 : 189-198
- 20) Hall C, et al. : Res Exp Med. 1986 ; 186 : 387-395
- 21) Sweet CS, et al. : J Cardiovasc Pharmacol. 1987 ; 10 : 636-642
- 22) Sweet CS, et al. : Eur J Pharmacol. 1988 ; 147 : 29-37

24. 文献請求先及び問い合わせ先

扶桑薬品工業株式会社 研究開発センター 学術室
〒536-8523 大阪市城東区森之宮二丁目3番30号
TEL : 06-6964-2763 FAX : 06-6964-2706
(9:00~17:30／土日祝日を除く)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

DAITO ダイト株式会社
富山県富山市八日町326番地

26.2 販売元

 扶桑薬品工業株式会社
大阪市城東区森之宮二丁目3番11号