

# くすりのしおり

注射剤

2025年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 製品名:無水エタノール注「フソー」

主成分:無水エタノール(Anhydrous ethanol)

剤形:注射剤

シート記載など:



## この薬の作用と効果について

肝臓にあるがん細胞の水分を奪い、タンパク質を凝固させることにより、がん細胞を死滅させます。通常、肝細胞がんにおける経皮的エタノール注入療法に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。エタノールに対する過敏症、腹水、肝障害、出血傾向がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ :医療担当者記入）
- ・通常、1日1回、週2回を限度として皮膚の上から肝細胞に注入します。
- ・具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

## 生活上の注意

- ・お酒に弱い方は全身状態の変化に十分注意してください。
- ・授乳中の方は、この薬を使用している間は授乳を避けてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として血圧低下、発熱、腹部の痛み、吐き気、食欲不振、倦怠感、酩酊感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・顔面が蒼白になる、胸が苦しい、意識が混濁する [ショック]
- ・胸が締め付けられるように痛い、息が苦しい [心筋梗塞]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

