

# くすりのしおり

内服剤

2025年12月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**製品名:**ビタミンC散「フロー」-100mg

**主成分:**アスコルビン酸(Ascorbic acid)

**剤形:**白色の散剤

**シート記載など:**



## この薬の作用と効果について

ビタミンC製剤で、コラーゲンの生成に関与して皮膚・骨・血管が弱くなるのを抑え、副腎をストレスから防御し、メラニン色素の生成を抑えるなどの作用があります。

通常、ビタミンC欠乏症の予防や治療、食事からの摂取が不十分な際の補給、薬物中毒や皮膚疾患などビタミンCの欠乏または代謝障害が推定される場合に用いられます。

## 次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は(( :医療担当者記入))
- 通常、成人は1日0.5~20g（主成分として50~2,000mg）を1~数回に分けて服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
  - 飲み忘れた場合は、気がついた時、できるだけ早く1回分を飲んでください。ただし次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた分は飲まずに、1回飛ばして次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
  - 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
  - 医師の指示なしに、飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- 臨床検査値に影響を与えることがありますので、検査を受ける場合は、この薬を飲んでいることを医師に必ず伝えてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、吐き気、下痢などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気を避けて室温（1~30℃）で保管してください。
- 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄方法がわからない場合は受け取った薬局や医療機関に相談してください。他の人に渡さないでください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。