

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

【使用上の注意】改訂のお知らせ

2026年3-4月
佐藤製薬株式会社

外用局所麻酔剤

リドカイン・プロピトカイン配合クリーム・貼付剤

エムラクリーム・エムラパッチ

劇薬、処方箋医薬品

注意－医師等の処方箋により使用すること

この度、弊社製品につきまして、【使用上の注意】を改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。今後のご使用に際しましては、改訂後の各項を十分ご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容（抜粋）

改訂後（ ___部：自主改訂）	改訂前
【使用上の注意】 11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明） 不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗、全身潮紅、呼吸困難、 血管性浮腫 （顔面浮腫、喉頭浮腫等）、血圧低下、顔面蒼白、脈拍の異常、意識障害等の症状が認められた場合には本剤の投与を直ちに中止し、適切な処置を行うこと。 11.1.2～11.1.3（略）	【使用上の注意】 11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明） 不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、発汗、全身潮紅、呼吸困難、血管浮腫（顔面浮腫、喉頭浮腫等）、血圧低下、顔面蒼白、脈拍の異常、意識障害等の症状が認められた場合には本剤の投与を直ちに中止し、適切な処置を行うこと。 11.1.2～11.1.3（略）

改訂理由

○自主改訂

血管性浮腫と血管浮腫は疾患として同じものを指しており、重篤副作用疾患別対応マニュアルや学会ガイドライン等でも「血管性浮腫」が使用されていることから、「血管浮腫」を「血管性浮腫」と記載を改めることといたします。

・本剤の電子化された添付文書については、PMDA ホームページ (<http://www.pmda.go.jp/>) に掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。

・添文ナビ^{てんぶん}®より以下の GS1 バーコードを読み取ることで本剤の電子化された添付文書をご覧いただけます。



(01)14987316135448

エムラクリームの GS1 バーコード



(01)14987316135646

エムラパッチの GS1 バーコード