

くすりのしおり

注射剤

2026年04月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名：ロカイン注 2%

主成分：プロカイン塩酸塩(Procaine hydrochloride)

剤形：注射剤

シート記載など：



この薬の作用と効果について

神経の活動電位の伝導を遮断して、局所麻酔作用を発揮します。

通常、硬膜外麻酔、伝達麻酔に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。メトヘモグロビン血症、高血圧、動脈硬化、心不全、甲状腺機能亢進症、糖尿病、血管けいれんがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、硬膜外麻酔、伝達麻酔として使用します。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、ねむけ、不安、興奮、目のかすみ、めまい、吐き気、じん麻疹、むくみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・血圧低下、顔面が蒼白になる、脈拍の異常、呼吸をしにくい [ショック]
- ・手足の震え [振戦]
- ・筋肉が発作的に収縮する状態 [けいれん]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。