

くすりのしおり

注射剤

2026 年 07 月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名：リプラス 1 号輸液（500mL バッグ）

主成分：塩化ナトリウム (Sodium chloride)
乳酸ナトリウム (Sodium lactate)
ブドウ糖 (Glucose)

剤形：注射剤

シート記載など：



この薬の作用と効果について

開始液（1 号液）に分類される輸液であり、複数の電解質と糖質としてブドウ糖を含有し、水分、電解質の補給効果を示します。

通常、脱水時、病態不明時、手術前後の水分と電解質の補給に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。高尿酸血症がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（（
：医療担当者記入））
- ・通常、静脈内に点滴します。
- ・具体的な使用期間については医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、急速・大量注射時の末梢のむくみなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。